

中化製藥動藥處 製品目錄

2011 PRODUCT CATALOG



CCPC

中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心，為動物鋪上健康之路

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

安蒙西林－150懸濁注射液	Amoxicillin-150	Injection	1
安西林鈉乾粉注射劑	Ancillina	Injection	1
抗菌寧口服劑	Anticolin	Oral Sol.	2
賜福樂素乾粉注射劑	Cephalothin	Injection	2
久強寧“長效”注射劑	Chanacycline L.A.	Injection	3
益樂富10%注射劑	Enroxacin 10%	Injection	3
獲利欣－300注射劑	Floricin-300	Injection	4
全達口服液	Gentacin	Oral Sol.	4
嘉黴素－100注射劑	Kanamycin-100	Injection	5
林可黴素－300注射劑	Lincomycin-300	Injection	5
讚配尼“長效”懸濁注射液	Paurain LA	Injection	6
配尼黴素－S 懸濁注射液	Penimycin-S	Injection	6
配尼濁懸濁注射液	Penisol	Injection	7
速免痢－C注射劑	Smelin-C	Injection	7
泰樂新注射劑	Tylosin	Injection	8
賜福樂軟膏劑	Cefurol	Ointment	9
泌多靈軟膏劑	Lactalin	Ointment	9
奧通奪軟膏劑	Oftentral	Ointment	10
萬靈素軟膏劑	Oxineomycin	Ointment	10
新萬靈素軟膏劑	Tetraneomycin	Ointment	11
舒美淨33½%注射劑	Sumezin 33½%	Injection	12
泰利美寧注射劑	Trimerin	Injection	12
泰利美寧48%口服液	Trimerin 48%	Oral Susp.	13
嘑蟲靈 5%	Flubenol 5%	Powder	14
嘑蟲靈 5%	Flubenol 5%	Powder	14
易滅蟲注射劑	Ivermectin	Injection	15

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

利必克注射劑	Lepicom-50	Injection	15
利必克顆粒	Lepicom-100	Granules	16
樂蟲滅—200	Levamix-200	Powder	16
新感冒靈—S注射液	Neo-Coldenin-S	Injection	17
賜鎮注射液	Stin	Injection	17
舒爾必寧50%注射液	Sulpyrin 50%	Injection	18
安期B—25消毒劑	Anti B-25	Solution	19
百潔碘—30消毒劑	Biodyne-30	Solution	19
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	20
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	20
血補維他—B12注射液	Hebovita	Injection	21
血能補—100注射液	Inoplex-100	Injection	21
美極命—G注射液	Methimin-G	Injection	22
維畜鈣注射劑	Polycalcium	Injection	22
保畜維他注射液	Polyvita	Injection	23
複方維他命B注射液	Vitalex	Injection	23
力克爽注射液	Dexamethasone	Injection	24
樂爾爽注射液	Donison	Injection	24
伊絲達蒙油性注射液	Estramon	Injection	25
催產素注射劑	Oxytocin	Injection	25
賜靜寧注射劑	Stresnil	Injection	26
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	27
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	27
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	28
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	28
倍賜興 10%	Bacitracin 10%	Powder	29

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品


賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	29
賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	30
氯多欣-150	Chlordoxin-150	Powder	30
氯多欣-250	Chlordoxin-250	W.S.Powder	31
可賜興-220	Cotusin-220	Powder	31
可賜興-666	Cotusin-666	W.S.Powder	32
多欣-200	Doxin-200	W.S.Powder	32
肥力王-R	Feradox-R	Powder	33
肥力王-VN	Feradox-VN	W.S.Powder	33
獲利欣 1%	Floricin 1%	Powder	34
林可黴素-110	Lincomycin-110	Powder	34
林可黴素-220	Lincomycin-220	Powder	35
林可黴素-400	Lincomycin-400	W.S.Powder	35
經四環素-220	Oxytetracycline-220	Powder	36
經四環素-500	Oxytetracycline-500	W.S.Powder	36
泰康欣-200	Tiacosin-200	Powder	37
泰利美寧	Trimerin	Powder	37
肥力王-110	Feradox-110	Powder	38
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	38
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	39
泰黴素-220	Tylosin-220	Powder	39
克嗽靈	Cousorin	Powder	40
克嗽靈	Cousorin	Powder	40
長生精精液稀釋劑	Semengra Semen Extender	Powder	41
長生精專用溶解液	Solvent for S. S. E	Solution	41
速保精 II 精液稀釋液	Sperm-up II	Solution	42



Pet Drugs

伴侶動物用藥品

芝波洗髮精20公絲	Ketoconazole 2%	Shampoo	43
舒露朗滴液	Surolan	Drops	43
富樂-B液	Hope-B Drops	Drops	44
保骨健	Perloquan	Granules	44
舒露清	Surosolve	Drops	45



Poultry Drugs

家禽用藥品

安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	46
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	46
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	47
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	47
賜福素散	Cephalin	Powder	48
賜福素散	Cephalin	Powder	48
氯多欣-250	Chlordoxin-250	W.S.Powder	49
可賜興-666	Cotusin-666	W.S.Powder	49
多欣-200	Doxin-200	W.S.Powder	50
雅黴素飲水劑	Erymycin WSP 500	W.S.Powder	50
獲利欣10%	Floricin 10%	Solution	51
林可黴素-400	Lincomycin 40%	W.S.Powder	51
羥四環素-500	Oxytetracycline-500	W.S.Powder	52
泰康欣 250	Tiacosin 250	Solution	52
泰樂新水溶性散	Tylosin	W.S.Powder	53
泰利美寧48%	Trimerin 48%	Solution	54
克寧納斯 0.5%	Clinacox 0.5%	Powder	55
嘑蟲靈 5%	Flubenol 5%	Powder	55
嘑蟲靈 5%	Flubenol 5%	Powder	56
滅球贊1%	Meacozan 1%	Powder	56
滅球靈	Mecozin	Powder	57
克寧納斯 0.5%	Clinacox 0.5%	Powder	58
滅球贊1%	Meacozan 1%	Powder	58
泰妙素 20%	Tiamulin-200	Powder	59
泰妙素 20%	Tiamulin-200	Powder	59
泰黴素-220	Tylosin-220	Powder	60



Poultry Drugs

家禽用藥品

克嗽靈	Cousorin	Powder	61
克嗽靈	Cousorin	Powder	61



Feed Supplements

補助飼料

得舒	Detoxol	W.S.Powder	62
益肥王	Ephepan	W.S.Powder	62
興奮綜合維生素	SYT-SV	Powder	63
育康茁仔豬專用礦物質	Eugurt-SPM Premix	Powder	64
興奮綜合礦物質	SYT-SM	Powder	64
倍多—E120	Better-E120	Powder	65
泌多乳 CDC—A1	CDC-A1	Powder	65
泌多乳 CDC—A2	CDC-A2	Powder	66
益肥王—M	Ephepan-M	Powder	66
育康茁仔豬用濃縮預拌精料	Eugurt-SPC supplement	Powder	67
速美畜	SGC-A5-1	Powder	67
中化酸寶401	Acidtec 401	Powder	68
雷利	Realdyme	Powder	68
斯蜜利 0.04%	Strongmix 0.04%	Powder	69
維樂徽敏	Vilocym Z	Powder	69

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000853</p>	<p>E000115</p>
<p>品 名</p>	<p>安蒙西林－150懸濁注射液[®] Amoxicillin-150[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>安西林鈉乾粉注射劑[®] Ancillina[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains : Amoxicillin Trihydrate....150mg(potency)</p>	<p>Each vial contains : Ampicillin Sodium....12.5gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療由革蘭氏陽性、陰性菌感染所引起之放線菌病、惡性水腫、沙氏桿菌症、氣腫疽、豬丹毒、出血性敗血症、大腸桿菌症及一般化膿症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤每日一次注射7mg，或每5公斤體重注射0.25ml，連續治療3~5天。 ※停藥期：10天，乳汁24小時</p>	<p>適應症 治療家禽畜由鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、變形菌等引起之感染症。</p> <p>用法用量 家畜：按體重每公斤每日一次注射10~20mg，嗜血桿菌症30mg。 家禽：按體重每公斤每日一次注射10~20mg。 ※停藥期：5天，乳汁：72小時</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000231</p>	<p>E611978</p>
<p>品 名</p>	<p>抗菌寧口服劑[®] Anticolin[®] Oral Sol. 100ml/10vial</p>	<p>賜福樂素乾粉注射劑[®] Cephalothin[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Gentamicin Sulfate eq. to Gentamicin.....50mg(potency)</p>	<p>Each vial contains: Cephalothin Sodium....5gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 預防及治療豬、雞大腸桿菌症、沙氏桿菌症及豬赤痢症。</p> <p>用法用量 豬：防治大腸桿菌症時，每8公升飲水加1ml。 防治赤痢症時，每4公升飲水加1ml；連續使用3天。 雞：每5公升飲水加3ml。 ※停藥期：3天</p>	<p>適應症 治療對Penicillin敏感菌、抗penicillin菌、大腸桿菌及其它對本品具有敏感性細菌所引起之感染症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤注射120~320mg，每日一次。以注射用蒸餾水溶解後，行肌肉或靜脈注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000602</p>	<p>E610685</p>
<p>品 名</p>	<p>久強寧“長效”注射劑® Chanacycline L.A.® Injection 100ml/5vial</p>	<p>益樂富10%注射劑® Enroxacin 10%® Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Oxytetracycline Dihydrate.....200mg</p>	<p>Each ml contains: Enrofloxacin.....100mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 急慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~30mg，每日一次行肌肉注射或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。 ※停藥期：28天，乳汁8天</p>	<p>適應症 治療牛、豬因革蘭氏陽性、陰性菌及黴漿菌所引起之感染症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤0.025~0.05ml計算，行肌肉注射。 ※停藥期：8天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E611813</p>	<p>E031156</p>
<p>品 名</p>	<p>獲利欣-300注射劑[®] Floricin-300[®] Injection 100ml/vial</p>	<p>全達口服液[®] Gentacin[®] Oral Sol. 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Florfenicol....300mg (potency)</p>	<p>Each ml contains: Gentamicin Sulfate....6.25mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療對Florfenicol敏感之病菌感染。牛：治療因Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus引起的呼吸道感染。豬：治療因Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae引起的呼吸道感染。</p> <p>用法用量 牛：肌肉：每15公斤體重注射本品1毫升，注射2劑，間隔48小時。皮下：每15公斤體重注射本品2毫升，使用16號針頭注射一劑。每一注射部位的注射劑量不得超過10毫升。 豬：肌肉：每20公斤體重注射本品1毫升，注射2劑，間隔48小時。每一注射部位的注射劑量不得超過10毫升。應使用16號針頭注射於頸部。</p>	<p>適應症 預防及治療1~3日齡出生小豬之大腸桿菌症，感染性下痢。 停藥期：屠宰食用乳豬，須停用本劑至少14天後行之。</p> <p>用法用量 小豬：口服一次劑量(幫浦按壓一次約0.8ml，相當於Gentamicin 5mg力價)</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E001294</p>	<p>E000509</p>
<p>品 名</p>	<p>嘉黴素－100注射劑[®] Kanamycin-100[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>林可黴素－300注射劑[®] Lincomycin-300[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Kanamycin Sulfate....100mg (potency)</p>	<p>Each ml contains: Lincomycin HCL....300mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 急慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~30mg，每日一次行肌肉注射或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。 ※停藥期：30天</p>	<p>適應症 治療革蘭氏陽性菌及其它具感受性細菌所引起之感染症：如細菌性肺炎、氣管炎、CRD、可利查、中耳炎、膿胸、細菌性腦膜炎、蜂窩組織炎、膿瘍、細菌性敗血症、放線菌症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~20mg之用量每日1~2次，依症狀增減。行肌肉注射或靜脈注射投藥。 ※停藥期：7天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E001342</p>	<p>E002123</p>
<p>品 名</p>	<p>讚配尼“長效”懸濁注射液® Paurain LA® Injection 100ml/10vial</p>	<p>配尼黴素-S 懸濁注射液® Penimycin-S® Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Benzathine Penicillin G....100,000 I.U. Procaine Penicillin G....100,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....200mg (potency)</p>	<p>Each 2ml contains: Procaine Penicillin G....400,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....0.5gm (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療革蘭氏陽性、陰性菌混合感染症，如：肺炎、豬丹毒、敗血症、子宮炎、乳房炎、母豬無乳症候群(MMA)。</p> <p>用法用量 豬、馬及牛：每100kg體重，每三天肌肉注射5~10ml。 仔豬、仔馬、仔牛及小動物：每25公斤體重，每三天肌肉注射1~2ml。 ※停藥期：肉用14天，乳用：擠乳10次</p>	<p>適應症 各型革蘭氏陽性、陰性菌混合感染症：肺炎、豬丹毒、化膿症、關節炎、乳房炎、子宮內膜炎、產乳熱、放線菌症、鈎端螺旋體及其它各種炎症。</p> <p>用法用量 家畜： 牛、馬 10 ~ 30ml 大豬 4 ~ 10ml 中豬 2 ~ 4ml 小豬 1~ 2ml或每公斤0.02 ~ 0.04ml計算 家禽：0.05 ~ 0.5ml/隻。 依體重症狀增減行肌肉注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E002336</p>	<p>E132653</p>
<p>品 名</p>	<p>配尼濁懸濁注射液[®] Penisol[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>速免痢-C注射液[®] Smelin-C[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Procaine Penicillin G....300,000 I.U</p>	<p>Each ml contains: Benzetimide HCL eq. to Benzetimide....0.15mg Chloramphenicol....200mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 革蘭氏陽性菌、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、放線菌引起之各種疾患。 支氣管炎、流行性感冒、帶炎、腹膜炎、外傷、手術前後之感染預防。 停藥期：7天，乳用：96小時</p> <p>用法用量 按體重每kg注射4,000~8,000 I.U. (0.013~0.027ml)，依症狀增減，每日一次行肌肉深部注射。</p>	<p>適應症 犬各種下痢症狀的治療。</p> <p>用法用量 犬：每2.5公斤體重，注射1ml。必要時，可每隔24小時後，重複注射本劑治療。 本劑限肌肉注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗生素

Antibiotics

產品	
製品編號	E610726
品名	泰樂新注射劑® Tylosin® Injection 100ml/10vial
成份	Each ml contains: Tylosin Tartrate....50mg (potency)
說明	<p>適應症 對禽畜革蘭氏陽性、陰性菌及類胸膜炎細菌引起之疾患均具療效。</p> <p>用法用量 牛：每50kg體重2~4ml 豬：每50kg體重2~8ml 初生豬：每kg注射0.2~0.5ml 家禽：每kg注射0.2~0.5ml 每日一次，按體重症狀增減行肌肉注射。 ※停藥期：8天，乳汁：96小時</p>
處方藥別	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

乳房炎軟膏劑

Ointment for Mastitis

產品		
製品編號	E000372	E001696
品名	賜福樂軟膏劑 [®] Cefuro [®] Ointment 7.5gm/20's	泌多靈軟膏劑 [®] Lactalin [®] Ointment 5.0gm/20's
成份	Each syringe contains: Cefuroxime sodium....250mg(potency)	Each syringe (5gm) contains: Ampicillin Sodium....75mg(potency) Cloxacillin Sodium....200mg(potency)
說明	<p>適應症 治療因革蘭氏陽性菌或革蘭氏陰性菌所引起的乳牛乳房炎。</p> <p>用法用量 將受感染的乳房乳汁擠淨後，以一支注射管的劑量注入受感染部位之乳管中。 ※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>	<p>適應症 因革蘭氏陽性、陰性菌所引起之急、慢性乳房炎之預防及治療，或由細菌所引起之各種局部症狀，如乳頭裂傷、糜爛、乳管發炎、瘻管、膿瘍、莖頭包皮炎、外耳炎、結膜炎、角膜炎、癬瘡。</p> <p>用法用量 治療前應將乳房內的牛乳或壞死組織完全擠出。每24小時注射一次，連續使用二天。 ※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

乳房炎軟膏劑

Ointment for Mastitis

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000310</p>	<p>E001483</p>
<p>品 名</p>	<p>奧通奪軟膏劑[®] Oftentral[®] Ointment 5.0gm/4's</p>	<p>萬靈素軟膏劑[®] Oxineomycin[®] Ointment 7.5gm/60's</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Miconazole Nitrate.....20mg Polymyxin B sulfate.....5,000 I.U.(potency) Bacitracin.....250 I.U.</p>	<p>Each syringe contains : Oxytetracycline HCL.....200mg (potency) Neomycin Sulfate.....25mg (potency) Sulfathiazole.....150mg Hydrocortisone Acetate.....20mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療眼炎、皮膚炎、乳房炎。(鴿子、犬、貓適用)</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>	<p>適應症 治療因葡萄球菌、鏈球菌及其它感染性細菌引起之乳房炎。</p> <p>用法用量 治療前應將乳房內的牛乳或壞死組織完全擠出。每一乳房每次注入1支，每隔24小時，連續施用，直到乳房及乳液恢復正常。對因鏈球菌、葡萄球菌引起乳房炎最好是每隔12或24小時施用一次。</p> <p>※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

乳房炎軟膏劑

Ointment for Mastitis

產品	
製品編號	E001469
品名	新萬靈素軟膏劑® Tetraneomycin® Ointment 8.0gm/60's
成份	Each syringe (8gm) contains: Tetracycline Hydrochloride....200mg(Potency) Neomycin Sulfate....250mg(potency) Bacitracin....2000I.U. Prednisolone....10mg
說明	<p>適應症 乳房炎之治療，包括由大腸桿菌、葡萄球菌所引起之乳房炎。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p> <p>※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

磺胺劑

Sulfonamides

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E043025</p>	<p>E043362</p>
<p>品 名</p>	<p>舒美淨33 1/3% 注射劑[®] Sumezin 33 1/3%[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>泰利美寧注射劑[®] Trimerin[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each 100ml contains: Sulfamethazine Sodium....33.3gm</p>	<p>Each ml contains: Trimethoprim....40mg Sulfadiazine....200mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 早發性大腸桿菌、球蟲症、流行性感冒、產褥熱、子宮內膜炎、陰道炎等各種細菌感染症。 停藥期：10天，乳汁：96小時。</p> <p>用法用量 牛、馬：20~40 ml。 豬、羊：5~20 ml。 犬、貓：2~5 ml。 或按體重初劑量每公斤0.3~0.6 ml，維持劑量減半。 每日一次，施行靜脈、肌肉或腹膜注射；但羊及綿羊則每日注射二次。</p>	<p>適應症 具廣泛之抗菌效果及療效。 呼吸系統：肺炎、氣管炎、支氣管炎。 消化疾病：細菌性白痢、胃腸炎。 泌尿生殖疾病：子宮炎、陰道炎、產褥熱、腎炎、膀胱炎等。 原蟲疾病：弓蟲症。 一般感染：敗血症、細菌性泌乳缺乏症、創傷感染、手術及生產後細菌感染。</p> <p>用法用量 一般動物行肌肉注射(請勿靜脈注射)，按體重每公斤注射0.06~0.1 ml，每日一次；視病症酌情增減劑量，必要時可於24~48小時後重複注射。※停藥期：10天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

磺胺劑

Sulfonamides

產品	
製品編號	E041418
品名	泰利美寧48%口服液 [®] Trimerin 48% [®] Oral Susp. 500ml/BTL
成份	Each ml contains: Sulfadiazine....400mg Trimethoprim....80mg
說明	<p>適應症</p> <p>雞：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症、傳染性可利查及其它二次性細菌感染。</p> <p>豬：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症。</p> <p>用法用量</p> <p>雞：500公升飲水中加入本劑200 ml。</p> <p>豬：400公升飲水中加入本劑200 ml。</p> <p>連續使用5天或症狀消失2天後，請勿超過14天。</p> <p>※停藥期：5天</p>
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E150141</p>	<p>E150127</p>
<p>品 名</p>	<p>嘑蟲靈 5%[®] Flubeniol 5%[®] Powder 18kg/Bag</p>	<p>嘑蟲靈 5%[®] Flubeniol 5%[®] Powder 600gm/Tin</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Flubendazole....50 gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Flubendazole....50 gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲、肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲及腎蟲。雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬標準劑量：1.個別驅蟲時：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲時：驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑時：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞標準劑量：1.驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用7天。2.驅除盲腸蟲時：30ppm(600gm/噸)連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲時：20ppm(400gm/噸)連續使用7天。</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲、肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲及腎蟲。雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬標準劑量：1.個別驅蟲時：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲時：驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑時：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞標準劑量：1.驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用7天。2.驅除盲腸蟲時：30ppm(600gm/噸)連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲時：20ppm(400gm/噸)連續使用7天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E150574</p>	<p>E152480</p>
<p>品 名</p>	<p>易滅蟲注射劑[®] Ivermectin[®] Injection 100ml/vial</p>	<p>利必克注射劑[®] Lepicom-50[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Ivermectin....10mg</p>	<p>Each ml contains: Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....50mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 控制及治療豬之內、外寄生蟲。</p> <p>用法用量 豬以頸部皮下注射行之，按體重每33公斤注射1ml。 ※停藥期：28天</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲及其移行性幼蟲、肺蟲、鞭蟲、腸類圓蟲、鈎蟲。 牛、羊：肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、鞭蟲、結節線圓蟲、小腸蟲、線蟲、大嘴腸蟲、血痢蟲。</p> <p>用法用量 本劑限肌肉注射。 驅除寄生蟲：每10公斤體重注射1ml。 免疫調整：每10公斤體重注射0.5ml。 ※停藥期：3天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產品</p>		
<p>製品編號</p>	<p>E172482</p>	<p>E172303</p>
<p>品名</p>	<p>利必克顆粒® Lepicom-100® Granules 500g/Tin</p>	<p>樂蟲滅-200® Levamix-200® Powder 20kg/Bag</p>
<p>成份</p>	<p>Each gm contains: Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....100mg</p>	<p>Each kg contains: Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....200 gm (potency)</p>
<p>說明</p>	<p>適應症 驅除豬、牛、羊之寄生蟲。同上亦可為免疫調整劑。</p> <p>用法用量 驅除寄生蟲：請詳閱說明書。 免疫調整：每噸飼料添加本品0.5kg。 ※停藥期：7天</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲及移行幼蟲、肺蟲、鞭蟲、腸型圓蟲類、腸對蟲及鉤蟲。 牛、羊：肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、鞭蟲、結節線圓蟲、小腸蟲、線蟲、大嘴腸蟲及血痢蟲。</p> <p>用法用量 豬建議劑量： 1. 每公斤體重Levamisole 5mg 2. 每噸飼料添加本品1.25kg~4kg(依豬群體重及採食量而定) 3. 集體驅蟲時(豬群總重kg × 5mg) × (飼料採食量kg) = 投予濃度mg (投與濃度mg/0.2)=投藥量gm ※抵抗疾病作免疫調節請與獸醫師洽商</p>
<p>處方藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛

Antipyretics & Analgesics

產品		
製品編號	E111753	E121565
品名	<p>新感冒靈-S注射液® Neo-Coldenin-S® Injection 100ml/10vial</p>	<p>賜鎮注射液® Stin® Injection 100ml/10vial</p>
成份	<p>Each ml contains: Chlorpheniramine Maleate....2.5mg dl-Methyl Ephedrine HCL....20mg Sulpyrin....150mg Benzyl Alcohol....15mg</p>	<p>Each ml contains: Phenylbutazone....200mg Sodium salicylate....20mg</p>
說明	<p>適應症 一般感冒、伴有發熱咳嗽之感冒、流行性感、肺炎、支氣管炎、咳嗽、氣喘、傷寒及其它疾病引起之發熱疼痛均可使用。 ※ 配合化學療法製劑使用，效果更佳。</p> <p>用法用量 牛、馬：(大)10~25 ml。(小)：5~10 ml 大豬：5~10ml 中豬：2~5ml 小豬：0.5~2ml。 羊、犬、貓：1~5ml 家禽：每公斤0.1 ml按症狀每日1~2次，行皮下或肌肉注射。</p>	<p>適應症 傳染性疾病、外傷與風濕性關節炎。急性的肺器官傳染病、心肌、心內膜炎。對於心與腎的損害、胃炎、血尿及水腫具有控制的功效。</p> <p>用法用量 對靜脈或肌肉行慢速注射。 大動物：治療的前兩天，使用20~30 ml，兩天後改用20 ml，以後則降為10 ml。 小馬小牛：前兩天10 ml，兩天後則用6 ml。 豬：每日以10~15 ml，行肌肉注射。</p>
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛

Antipyretics & Analgesics

產品	
製品編號	E122951
品名	舒爾必寧50%注射液 [®] Sulpyrin 50% [®] Injection 100ml/10vial
成份	Each vial contains: Sulpyrin.....50%
說明	<p>適應症 減輕所有動物之症狀、炎症及其它一切熱性疾病之鎮痛解熱。</p> <p>用法用量 牛：按體重每100公斤注射8ml。 馬：20~60 ml。 犢、幼獸：5~15 ml。 豬：10~30 ml。 羊：2~8 ml。 犬、貓：1~5 ml。 按體重症狀增減，每日1~2次，最好施行靜脈注射或肌肉、靜脈混合注射亦可。</p>
處方藥別	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

消毒劑

Disinfecting Agents

產品		
製品編號	E141615	E140267
品名	<p>安期B-25消毒劑® Anti B-25® Solution</p> <p style="text-align: right;">4L</p>	<p>百潔碘-30消毒劑® Biodyne-30® Solution</p> <p style="text-align: right;">3.8L</p>
成份	<p>Each ml contains: Benzalkonium Chloride....25%</p>	<p>Each ml contains: Available Iodine (Nonoxynol-9 Iodine 20%)....30mg</p>
說明	<p>適應症 消毒殺菌劑、雞舍、豬舍、畜體、水池、鰻池、農牧場舍、手術器具之清潔殺菌消毒。</p> <p>用法用量 畜舍消毒：800~1200倍噴洗。 器皿消毒：500~1000倍浸洗。 水池消毒：2000~4000倍。</p>	<p>適應症 本品適用於禽、畜舍之豬傳染性胃腸炎(TGE)、傳染性支氣管炎(IB)、慢性呼吸器病(CRD)、新城雞病(ND)、假性狂犬病(PR)、豬水泡病(SVD)等病原、畜體、禽畜用器具及動物用飲水等之消毒。</p> <p>用法用量 稀釋倍數，請詳閱說明書。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

消毒劑

Disinfecting Agents

產品		
製品編號	E091248	E140092
品名	碘浴寶消毒液® Iodiper® Solution 5L	碘浴寶消毒液® Iodiper® Solution 20L
成份	Each ml contains : Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg	Each ml contains : Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg
說明	<p>適應症 在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及擠乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。豬子宮內膜炎及分娩時消毒使用。</p> <p>用法用量 乳頭浸浴：不需稀釋。 乳頭噴霧：不需稀釋。 乳房清洗：75ml加4公升清水。 手部消毒：75ml加4公升清水。 子宮清洗：稀釋成2.5%注入。</p>	<p>適應症 在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及擠乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。豬子宮內膜炎及分娩時消毒使用。</p> <p>用法用量 乳頭浸浴：不需稀釋。 乳頭噴霧：不需稀釋。 乳房清洗：75ml加4公升清水。 手部消毒：75ml加4公升清水。 子宮清洗：稀釋成2.5%注入。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝注射液

Injectable Nutrition and Metabolic Agents

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E091523</p>	<p>E611727</p>
<p>品 名</p>	<p>血補維他—B12注射液[®] Hebovita[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>血能補—100注射液[®] Inoplex-100[®] Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Cyanocobalamin....300 mcg D-Panthenol....30 mg Dextrose....50 mg</p>	<p>Each ml contains: Iron dextran complex eq. to Iron....100mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 仔豬貧血 營養不良 促進發育 增加乳汁 增加體重。</p> <p>用法用量 成豬：10~15 ml 中豬：5~8 ml 小豬：3~5 ml 哺乳豬：1~2 ml 乳豬：1.5~3 ml (仔豬生後3~10日即可注射) 施行後腿深部肌肉注射，重症者酌予增加注射次數。</p>	<p>適應症 預防及治療仔豬缺鐵性貧血症。</p> <p>用法用量 預防：仔豬出生2~5天內，後腿肌肉深部注射1ml。 治療：通常於出現缺鐵症狀時，後腿肌肉深部注射1ml，若症狀未見改善時，再補充1ml。症狀嚴重時，後腿肌肉深部注射2ml。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝注射液

Injectable Nutrition and Metabolic Agents

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E081625</p>	<p>E101398</p>
<p>品 名</p>	<p>美極命-G注射液® Methimin-G® Injection 100ml/10vial</p>	<p>維畜鈣注射劑® Polycalcium® Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: DL-Methionine....2.5mg Thiamine HCL(B1)....25mg Riboflavin(B2)....10mg Dextrose....10mg</p>	<p>Each ml contains: Calcium Gluconate....500 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 維持肝臟正常功能、解毒、食慾不振、消除疲勞、酸中毒、腹水、浮腫。</p> <p>用法用量 牛、馬(大): 100~250ml 牛、馬(中): 50~100ml 牛、馬(小): 30~50ml 豬、羊、犬(大): 20~30ml 豬、羊、犬(中): 10~20ml 豬、羊、犬(小): 3~10ml 或按體重每公斤0.6ml, 每日一次, 行靜脈或肌肉注射; 必要時視症狀增加劑量及次數並連續使用。</p>	<p>適應症 低血鈣、乳熱、四肢搖弱、缺鈣麻痺、產乳麻痺。過敏性、中毒性及神經性疾患鈣代謝障礙、佝僂症、骨質軟化症、酮尿症、新生動物機能萎縮。一般代謝障礙、分娩無力。農藥、四氯化碳、鉛、氟、氰、草酸、酒石酸、有機氯、殺蟲劑及其它化學藥品中毒, 或肝損傷之預防及輔助治療。</p> <p>用法用量 牛、馬(500kg↑): 90~125ml, 牛、馬(100~500kg): 30~90ml, 犢牛、小馬: 20~30ml, 羊: 20~30ml, 視症狀增減劑量, 行皮下、肌肉或靜脈注射。 豬: 20~30ml, 皮下注射。仔豬: 2~3ml, 皮下注射。 犬: 2~4ml, 肌肉或靜脈注射。貓: 0.5~3ml, 肌肉注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝注射液

Injectable Nutrition and Metabolic Agents

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E091547</p>	<p>E091547</p>
<p>品 名</p>	<p>保畜維他注射液® Polyvita® Injection 100ml/10vial</p>	<p>複方維他命B注射液® Vitalex® Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>每ml含： Vit.B1...1.12mg, Vit.B2...0.10mg Vit.B6...0.10mg, Vit.B12...0.30ug Niacin...2.00mg, DL-Met....10mg Ca.Panto....2.00mg, Inositol...1.00mg Choline...1.00mg, Dextrose...50.00mg Caffeine and Sod.Benzoate...30.00mg</p>	<p>Each ml contains： Thiamine Hydrochloride....100 mg Riboflavin....5 mg Pyridoxine Hydrochloride....5 mg Niacinamide....50 mg D-Panthenol....5 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 消除疲勞、產前產後營養補給、增強肝臟機能、強心、解毒及身體組織賦活。</p> <p>用法用量 大動物：50~100ml 中動物：20~50ml 每日1~2次肌肉或皮下注射。</p>	<p>適應症 口內炎、神經炎、營養失調、貧血、疲勞、營養補給，及維他命B1、B2及B6缺乏諸症。</p> <p>用法用量 小豬(40公斤以下)：1~2 ml。 中豬(40~75公斤)：2~3 ml。 大豬(75公斤以上)：3~5 ml。 牛馬：1~10 ml。 幼牛馬、綿羊、山羊：1~5 ml。 貓、狗、兔：1~2 ml。 行皮下、肌肉或靜脈注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

荷爾蒙

Hormones

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E060543</p>	<p>E060639</p>
<p>品 名</p>	<p>力克爽注射液® Dexamethasone® Injection 100ml/10vial</p>	<p>樂爾爽注射液® Donison® Injection 100ml/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each ml contains: Dexamethasone Sodium Phosphate eq.to Dexamethasone Phosphate....1mg</p>	<p>Each ml contains: Prednisolone Acetate....10mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 酮症Ketosis 產前產後之後肢麻痹、喘息、支氣管炎、肺炎、神經痛、過敏性皮膚炎、犬瘟熱初期炎症之緩解。</p> <p>用法用量 牛： 10~30 ml。馬： 5~20 ml。 羊： 5~10 ml。大豬： 5~10ml。 中豬： 3~5 ml。小豬： 0.5~2 ml。 犬： 0.25~2 ml。貓、兔： 0.125~0.5ml。 每日一次，施行皮下、肌肉或靜脈注射。 ※停藥期： 5天</p>	<p>適應症 關節炎、子宮炎、乳房炎、皮膚炎、風濕痛、肺疫。</p> <p>用法用量 按體重每公斤注射1mg，每日一次，行皮下或肌肉注射。 ※停藥期： 5天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

荷爾蒙

Hormones

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E611899</p>	<p>E611947</p>
<p>品 名</p>	<p>伊絲達蒙油性注射液® Estramon® Injection 10ml/12vial</p>	<p>催產素注射劑® Oxytocin® Injection 10ml/12vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each vial contains: Estradiol Benzoate....20mg</p>	<p>Each ml contains: Oxytocin Synthetic....10Units</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卵巢機能減退、乳汁分泌不足。 2. 人工誘導發情，促進受精。 3. 流產、早產、子宮內膜炎、產後停滯。 <p>用法用量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 牛：5~10ml/日，馬：2~5ml/日，豬、羊：2~3ml/3日一次，犬、貓：0.5~2ml/3日一次 2. 牛、馬：10~20ml/一週三次，豬、羊：5~10ml/次，犬、貓：5ml/次 3. 牛、馬：10 ml，豬、羊：5ml，犬、貓：1~5ml。施行肌肉注射。 <p>※停藥期：7天</p>	<p>適應症</p> <p>刺激子宮、增強分娩時子宮之收縮力，預防產後出血及產後子宮鬆弛；治療分娩時子宮收縮無力、子宮出血及產後子宮收縮不全。</p> <p>用法用量</p> <p>牛、馬：5~10 ml。 豬、羊：3~5ml。 犬、貓：0.1~1.5ml。</p> <p>※使用本劑時，應在母畜子宮頸已擴張後才能注射，否則易導致子宮破裂。施行肌肉或皮下注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第一類</p>	<p>第一類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

精神安定劑

Tranquilizers

產品	
製品編號	E162839
品名	賜靜寧注射劑 [®] Stresnil [®] Injection 100ml/5vial
成份	Each ml contains: Azaperone....40mg
說明	<p>適應症</p> <p>專用於控制豬精神安定方面：包括豬的狂燥、興奮時鎮靜、移動、運輸或併欄時爭鬥防止及情緒緩和。</p> <p>※ 肌肉注射時應使用消毒過之長注射針在耳根後垂直注射或深入後腿，以避免因用法不正確或用量不足而導致效果不良。</p> <p>用法用量</p> <p>攻擊性母豬：1ml / 20kg, I.M.</p> <p>緊迫之預防及緩解：0.5~1ml / 20kg, I.M.</p> <p>公豬載運：0.5ml / 20kg, I.M</p> <p>心臟負荷過重、急性心衰竭：1ml / 100kg, I.M.</p> <p>待宰肉豬之載運：1ml /頭。</p> <p>鹿隻鋸茸：1ml / 10kg, I.M.</p>
處方藥別	第一類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder



產品		
製品編號	E001524/P610552	E001672
品名	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder 20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder 1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：50mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：12mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：125gm/每噸水，1~3天。(2)治療：250gm/每噸水，2~3天 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：50mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：12mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：125gm/每噸水，1~3天。(2)治療：250gm/每噸水，2~3天 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

產品		
製品編號	N000065	E001380
品名	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p>20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p>1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：20mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：4.8mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：50gm/每噸水，1~3天。(2)治療：100gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：20mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：4.8mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：50gm/每噸水，1~3天。(2)治療：100gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>N000584</p>	<p>P610569</p>
<p>品 名</p>	<p>倍賜興 10%[®] Bacitracin 10%[®] Powder</p>	<p>賜福素散[®] Cephalexin[®] W.S.Powder</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Bacitracin Methylene Disalicylate....100gm(potency)</p>	<p>Each gm contains: Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 雞(蛋雞除外): 治療枯草菌素感受性菌感染。 豬: 治療對本劑具感受性細菌引起之下痢。</p> <p>用法用量 雞(蛋雞除外): 每公噸飼料添加量1.1~5.5kg(110~550ppm) 豬: 每公噸飼料添加量1.1kg(110ppm)</p>	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。 雞: 傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。 豬: 細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓: 每公斤體重投予本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投予，每日二次。 雞、豬: 每公升飲水添加本藥300~600mg。 猴: 每公斤體重投予本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投予，每日二次。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>P611285</p>	<p>N000508</p>
<p>品 名</p>	<p>賜福素散[®] Cephalin[®] W.S.Powder 1kg/Bag</p>	<p>氯多欣-150[®] Chlordoxin-150[®] Powder 25kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains: Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)</p>	<p>Each kg contains: Chlortetracycline HCL....150gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。 雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。 豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：每公斤體重投予本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投予，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。 猴：每公斤體重投予本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投予，每日二次。</p>	<p>適應症 豬：治療細菌性腸炎及呼吸道疾病 雞：治療慢性呼吸器疾病細菌性肺炎，滑膜炎及藍冠病。</p> <p>用法用量 豬：100~220 ppm (0.66~1.46 kg) 雞：100~220 ppm (0.66~1.46 kg)</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N000436</p>	<p>N000429</p>
<p>品 名</p>	<p>氯多欣-250[®] Chlordoxin-250[®] W.S.Powder</p>	<p>可賜興-220[®] Cotusin-220[®] Powder</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Chlortetracycline HCL....250gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Lincomycin HCL....110gm Spectinomycin sulfate....110gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：治療細菌性腸炎及呼吸道疾病 雞：治療慢性肺炎呼吸器疾病細菌性肺炎，滑膜炎及藍冠病。</p> <p>用法用量 1gm溶於1~2公升飲水中，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：雞1天；豬2天</p>	<p>適應症 治療豬赤痢、細菌性腸炎、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎</p> <p>用法用量 每噸飼料添加本品0.2~0.5 kg，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：1天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

產品		
製品編號	N000405	N000072
品名	可賜興-666 [®] Cotusin-666 [®] W.S.Powder	多欣-200 [®] Doxin-200 [®] W.S.Powder
成份	Each 150g contains: Lincomycin HCL....33.3gm Spectinomycin HCL....66.7gm	Each gm contains: Doxycycline Hyclate....200 mg (potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 <p>用法用量</p> 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 ※停藥期：8天	<p>適應症</p> 治療家禽CRD及併發症如可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎、丹毒皮膚炎、膿腫及大腸桿菌感染症。 <p>用法用量</p> 添加於飲水中，劑量為50ppm即1噸水中添加本劑250公克。 ※停藥期：3天
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N000522</p>	<p>N170386</p>
<p>品 名</p>	<p>肥力王-R[®] Feradox-R[®] Powder 25kg/Bag</p>	<p>肥力王-VN[®] Feradox-VN[®] W.S.Powder 460gm/Tin</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Ronidazole....120gm</p>	<p>每公斤含有: Neomycin Sulfate...11.628g Vit.A...1,395,349I.U., Vit.D3...465,116I.U. Vit.K...1.163g, Vit.E...744 I.U., Vit.B1...0.465g Vit.B2...1.395g, Vit.B12...6.977mg, Vit.B5...9.302g Fe...15.4 g, Cu...0.465g</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬: 治療對本劑具有感受性豬赤痢螺旋體引起之感染。</p> <p>用法用量 1000公升水添加本劑0.5公斤 ※ 停藥期: 3天</p>	<p>適應症 預防及治療仔豬細菌性腸炎及貧血。</p> <p>用法用量 豬: 1. 每天每窩(10隻)20日齡內仔豬使用量: 每一公升飲水添加23公克口服投予。 2. 每天每窩(10隻)20日齡以上仔豬使用量: 每一公升飲水添加23公克口服投予。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

產品		
製品編號	N000151	E001005
品名	<p>獲利欣 1%[®] Floricin 1%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>林可黴素-110[®] Lincomycin-110[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Florfenicol....10 gm (potency)</p>	<p>Each kg contains: Lincomycin HCL....110 gm (potency)</p>
說明	<p>適應症 治療由嗜血桿菌所引起的豬胸膜肺炎。</p> <p>用法用量 添加2~4 kg / 每噸飼料，或0.1~0.2gm/kg 體重(相當於1~2 mg)</p>	<p>適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加本品0.4~1kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

產品		
製品編號	N000041	E001665
品名	林可黴素-220 [®] Lincomycin-220 [®] Powder 20kg/Bag	林可黴素-400 [®] Lincomycin-400 [®] W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains: Lincomycin HCL....220 gm (potency)	Each kg contains: Lincomycin HCL....400 gm (potency)
說明	<p>適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加本品0.2~0.5kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天</p>	<p>適應症 豬：治療赤痢 肉雞：治療壞死性腸炎</p> <p>用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當250mg，連續最多投予10天。 雞：每公升飲水添加相當16.9 mg，連續使用7天。 ※ 停藥期：豬1天，雞2天</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N000577</p>	<p>N000216</p>
<p>品 名</p>	<p>羧四環素-220[®] Oxytetracycline-220[®] Powder 25kg/Bag</p>	<p>羧四環素-500[®] Oxytetracycline-500[®] W.S.Powder 1kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Oxytetracycline Base....220 gm (potency)</p>	<p>Each gm contains: Oxytetracycline HCL....500 mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：治療呼吸道及腸道細菌性下痢症及對羧四環素敏感之細菌。 家禽：治療廣泛的細菌性感染症以及對羧四環素敏感之細菌。 犢羊、犢牛：治療呼吸道、敗血症及腸道感染。</p> <p>用法用量 豬：每公噸飼料添加0.5~0.9公斤 家禽：每公噸飼料添加0.5~0.9公斤 犢羊、犢牛：每公噸飼料添加2.7公斤 ※ 停藥期5天</p>	<p>適應症 治療豬具敏感性細菌感染所引起的腸炎及肺炎；治療雞具敏感性細菌感染所引起的慢性呼吸器病、傳染性可利查及下痢。</p> <p>用法用量 豬：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：3天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic Powder



產品		
製品編號	N000443	E173397
品名	泰康欣-200 [®] Tiacosin-200 [®] Powder 10kg/Bag	泰利美寧 [®] Trimerin [®] Powder 1kg/Tin
成份	Each kg contains: Tilmicosin phosphate....200 gm (potency)	Each gm contains : Sulfadimethoxine....400 mg Trimethoprim....80 mg
說明	<p>適應症 控制由放線桿菌，黴漿菌及巴斯德桿菌或其它對Tilmicosin敏感的微生物引起的肺炎。</p> <p>用法用量 治療肥育期豬隻肺炎： 2kg/每噸飼料，連續餵食14天。 ※ 停藥期：14天</p>	<p>適應症 豬：各種細菌性下痢、黃白痢、MMA綜合症、細菌性肺炎、關節炎、鼻炎。 雞：細菌性下痢、白痢、傳染性可利查、家禽霍亂、大腸桿菌症。</p> <p>用法用量 控制： 每噸飼料添加本品250gm 治療： 每噸飼料添加本品400gm ※ 停藥期：15天</p>
處方藥別	第三類	

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

含藥物飼料添加劑

Medicated Feed Additives



產品		
製品編號	E171182	N000498
品名	<p>肥力王-110[®] Feradox-110[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>	<p>泰妙素 20%[®] Tiamulin 20%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Carbadox....110gm</p>	<p>Each kg contains: Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>豬:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 促進生長及改進飼料利用效率。 2. 預防控制豬赤痢及細菌性腸炎。 <p>用法用量</p> <p>豬:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每噸飼料添加0.1~0.25 kg(11~28ppm) 2. 每噸飼料添加0.45~0.5 kg(50~55ppm) <p>※ 停藥期: 4週</p>	<p>適應症</p> <p>豬: 傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的預防與治療。 雞: 慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※ 請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用, 以防毒性發生。</p> <p>用法用量</p> <p>豬:</p> <p>流行性肺炎: 添加1~2kg/每噸飼料, 連續使用5~7天。 豬赤痢: 添加0.5kg/每噸飼料, 連續使用3~6天。 雞: 每噸飼料添加1~2公斤, 連續使用3~5天。 ※ 停藥期: 7天</p>
處方藥別	第三類	

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

含藥物飼料添加劑

Medicated Feed Additives



產品		
製品編號	P611199	E003007
品名	泰妙素 20% [®] Tiamulin 20% [®] Powder 20kg/Bag	泰黴素-220 [®] Tylosin-220 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains: Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)	Each kg contains: Tylosin phosphate....220 gm (potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的預防與治療。 雞：慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 <p>用法用量</p> 豬： 流行性肺炎：添加1~2kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天	<p>適應症</p> 雞：促進生長及改進飼料利用效率 產蛋雞：改進飼料利用效率 豬：1.可預防豬赤痢2.促進生長及改進飼料利用效率 <p>用法用量</p> 雞：每噸飼料添加20~250公克 產蛋雞：每噸飼料添加100~250公克 豬：1.預防豬赤痢：每噸飼料添加454~500公克連續餵飼3週後，改用200公克至出售。2.促進生長及改進飼料利用效率：(1)體重60kg以上的豬：每噸飼料添加50~100公克，(2)體重30~60kg的豬：每噸飼料添加100~200公克，(3)體重10~30kg的豬：每噸飼料添加100~500公克。
處方藥別	第三類	

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other Preparations

產品		
製品編號	N000601	N000319
品名	克嗽靈® Cousorin® Powder 1kg/Bag	克嗽靈® Cousorin® Powder 20kg/Bag
成份	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other Preparations

產品		
製品編號	P611450	E611435
品名	長生精精液稀釋劑 [®] Semengra Semen Extender [®] Powder 25gm*2Bag	長生精專用溶解液 [®] Solvent for S. S. E [®] Solution 500ml/20Btl
成份		
說明	<p>適應症 稀釋精液及延長精液保存時間。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>	<p>適應症 稀釋精液及延長精液保存時間。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>
處方藥別		

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other Preparations

產品	
製品編號	E451509
品名	速保精 II 精液稀釋液 [®] Sperm-up II [®] Solution 500ml/20Btl
成份	
說明	<p>適應症 稀釋精液及延長精液保存時間。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>
處方藥別	

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

抗生素

Antibiotics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>D450442</p>	<p>E390109</p>
<p>品 名</p>	<p>芝波洗髮精20公絲[®] Ketoconazole 2%[®] Shampoo 3.8L</p>	<p>舒露朗滴液[®] Surolan[®] Drops 15ml/Btl</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains: Ketoconazole....20mg</p>	<p>Each ml contains: Miconazole Nitrate....23mg Prednisolone Acetate....5mg Polymyxin B Sulfate....0.5293mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 減少因黴菌感染所引起之頭皮屑治療之輔助劑。</p> <p>用法用量 醫師藥師藥劑生指示藥品。</p> <p>1.治療：(1)脂漏性皮膚炎及頭皮屑：每週二次，連續四週。(2)汗斑：每天一次，連續五天。</p> <p>2.預防：(1)脂漏性皮膚炎及頭皮屑：每週或每二週一次。(2)汗斑：夏季來臨前，每天一次，連續三天。</p> <p>〔用法〕先用清水沖過後，取本品用量約為掌心大小，搓揉按摩頭部約3~5分鐘，增加效用，再用清水沖淨即可，應避免再用潤絲精以利效用。</p>	<p>適應症 治療貓、狗因黴菌、酵母、革蘭氏陰、陽性細菌引起之耳炎、皮膚感染，以及由耳疥蟲(Ear mite)引起之耳炎。</p> <p>用法用量 耳：聽道洗淨，一天二次，滴本劑數滴入耳，再按摩之，使之完全吸收。</p> <p>皮膚：依傷口大小滴數滴，一天二次。</p> <p>治療直至症狀完全消失數天為止，頑固症狀有時須2~3週。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

營養代謝

Nutrition and Metabolic Agents

<p>產品</p>		
<p>製品編號</p>	<p>E050494</p>	<p>E101910</p>
<p>品名</p>	<p>富樂-B液® Hope-B Drops® Drops</p>	<p>保骨健® Perloquan® Granules</p>
<p>成份</p>	<p>每ml含： Vit.A...1,000I.U.， Vit.D2...100I.U. Vit.B1...1mg， Vit.B2...0.25mg Vit.B6...0.25mg， Niacin.....2.5mg D-Panthenol...1mg， Vit.C...10mg Vit.B12...0.25mcg， Biotin(H)...5mcg L-Lysine...15mg， DL-Threonine...7.5mg</p>	<p>大豆蛋白濃縮物15%， 碳酸鈣3%， 葡萄糖10%， 鎂0.5%， 穀類9%， 食鹽0.1%， 海藻鈣7%， 小麥澱粉7%， 各種中草藥8%， 綠唇貝粉6%， 矽藻土6%， 啤酒酵母6%， 維生素 E 0.17%， 糖蜜酵母6%， 生物素0.015%， 海藻粉4%， 純卵磷脂2.25%， 黍粒10%</p>
<p>說明</p>	<p>適應症 促進發育、增進食慾、增加體重、疾病感染抵抗力之增強、體力賦活、體質強化、蛋白質代謝改善、營養補給等。</p> <p>用法用量 幼犬。每次0.5~1ml，一日三次。必要時可增加用量。 貯藏法：室溫：遮光貯存。</p>	<p>適應症 幼犬→促進關節的健康發育 成犬→提供骨關節炎及關節疾病的治療 老年犬→恢復及增強活力與活動力</p> <p>用法用量 可按體重直接給飼或添加於飼料中給予： 10公斤以上的狗：5公克/天(0.5匙) 20公斤以上的狗：10公克/天(1匙) 30公斤以上的狗：15公克/天(1.5匙) 超過30公斤以上的狗：每10公斤體重5公克/天 (量匙置於包裝內，1匙相當於產品10公克)</p>
<p>處方藥別</p>		

伴侶動物用藥品

Pet Drugs

潔耳劑

Ear clean

產品	
製品編號	E432003
品名	舒露清® Surosolve® Drops 125ml/Btl
成份	水楊酸、tris-EDTA、對氯間二甲苯酚(PCMX)、多庫酯鈉、芳香劑、純水
說明	<p>用法用量</p> <p>將足量的舒露清®塗抹於耳道基部，溫柔地按摩耳朵根部並擦去多餘的產品。本產品不可使用於耳鼓膜破裂之患畜，如果無法確定時請尋求您的獸醫師的建議。本品只供動物使用，請存放於兒童伸手及視線無法觸及之處。</p> <p>pH值6.8含有宜人香氣的配方組合，可常保您寵物耳道的乾淨與清爽。</p>
處方藥別	

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics



產品		
製品編號	E001524/P610552	E000963
品名	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder 20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder 1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：50mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：12mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：125gm/每噸水，1~3天。(2)治療：250gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：50mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：12mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：125gm/每噸水，1~3天。(2)治療：250gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	N000065	E001380
品名	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：20mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：4.8mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：50gm/每噸水，1~3天。(2)治療：100gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>	<p>適應症 防治家畜細菌感染所引起之疾病肺炎、嗜血桿菌性肺炎、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症、巴氏桿菌症、沙門氏菌症。 防治家禽細菌感染所引起之疾病性肺炎、CRD、可利查、大腸桿菌症、細菌性下痢、葡萄球菌症。</p> <p>用法用量 1.豬：20mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。2.犢牛：4.8mg/每公斤體重，泡水或直接灌食，一天兩次，連續3~5天。3.家禽：(1)預防：50gm/每噸水，1~3天。(2)治療：100gm/每噸水，2~3天。 ※停藥期：豬15天，牛20天，雞5天</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	P610569	P611285
品名	賜福素散 [®] Cephalin [®] Powder 20kg/Bag	賜福素散 [®] Cephalin [®] Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains: Cephalexin Monohydrate....150 mg (potency)	Each gm contains: Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)
說明	<p>適應症</p> <p>治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量</p> <p>犬、貓：每公斤體重投予本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投予，每日二次。雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投予本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投予，每日二次。</p>	<p>適應症</p> <p>治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量</p> <p>犬、貓：每公斤體重投予本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投予，每日二次。雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投予本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投予，每日二次。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	N000436	N000405
品名	氯多欣-250 [®] Chlordoxin-250 [®] W.S.Powder 1kg/Bag	可賜興-666 [®] Cotusin-666 [®] W.S.Powder 750gm/Tin
成份	Each kg contains: Chlortetracycline HCL....250gm(potency)	Each 150g contains: Lincomycin HCL....33.3gm Spectinomycin HCL....66.7gm
說明	<p>適應症</p> 豬：治療細菌性腸炎及呼吸道疾病 雞：治療慢性肺炎呼吸器疾病細菌性肺炎，滑膜炎及藍冠病。 <p>用法用量</p> 1gm溶於1~2公升飲水中，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：雞1天；豬2天	<p>適應症</p> 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 <p>用法用量</p> 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 ※停藥期：8天
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	N000106	E000633
品名	<p>多欣-200[®] Doxin-200[®] W.S.Powder</p> <p>500g*2/Tin</p>	<p>雅黴素飲水劑[®] Erymycin WSP 500[®] W.S.Powder</p> <p>1kg/Tin</p>
成份	<p>Each gm contains: Doxycycline Hyclate....200mg (potency)</p>	<p>Each gm contains: Erythromycin Thiocyanate....500mg(potency)</p>
說明	<p>適應症 治療家禽CRD及併發症如可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎、丹毒皮膚炎、膿腫及大腸桿菌感染症。</p> <p>用法用量 添加於飲水中，劑量為50ppm即1噸水中添加本劑250公克。 ※停藥期：3天</p>	<p>適應症 治療雞隻呼吸器病(CRD)、傳染性可利查。</p> <p>用法用量 1. 一般治療：每公噸飲水添加本劑200公克使用5天或依獸醫指示使用。 2. 緊迫治療：每公噸飲水添加本劑200公克，最好在緊迫前二天即開始使用，繼續服用三天，在緊迫期間維生素及礦物質亦須添加。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	E611837	E001665
品名	<p>獲利欣10%[®] Floricin 10%[®] Solution</p> <p>500ml/Btl</p>	<p>林可黴素-400[®] Lincomycin 40%[®] W.S.Powder</p> <p>1kg/Bag</p>
成份	<p>Each ml contains: Florfenicol....100 mg</p>	<p>Each kg contains: Lincomycin HCL....400gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 豬：治療豬嗜血桿菌胸膜肺炎。</p> <p>用法用量 豬：每日每公斤體重投與本品0.01~0.02ml,加入飲水混合後經口投予。</p>	<p>適應症 豬：治療赤痢肉 雞：治療壞死性腸炎</p> <p>用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當250mg, 連續最多投予10天。 雞：每公升飲水添加相當16.9 mg, 連續使用7天。 ※ 停藥期：豬1天, 雞2天</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品		
製品編號	N000216	E611882
品名	氧四環素-500 [®] Oxytetracycline-500 [®] W.S.Powder 1kg/Bag	泰康欣 250 [®] Tiacosin 250 [®] Solution 480ml/Btl
成份	Each gm contains : Oxytetracycline HCL....500mg(potency)	Each ml contains : Tilmicosin phosphate eq. to Tilmicosin....250 mg (potency)
說明	<p>適應症 治療豬具敏感性細菌感染所引起的腸炎及肺炎；治療雞具敏感性細菌感染所引起的慢性呼吸器病、傳染性可利查及下痢。</p> <p>用法用量 豬：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：3天</p>	<p>適應症 豬：對因Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes 以及其它對tilmicosin具感受性的微生物病源體所引起的豬呼吸道疾病之防治。 雞：對因Mycoplasma gallisepticum 以及M.synoviae 所引起的雞呼吸道疾病之防治。</p> <p>用法用量 豬：100公升的飲水中加入80毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有200毫克的tilmicosin，且連續使用5天。 雞：100公升的飲水中加入30毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有75毫克的tilmicosin，且連續使用3天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗生素

Antibiotics

產品	
製品編號	E003454
品名	泰樂新水溶性散 [®] Tylosin [®] W.S.Powder 750g/Tin
成份	Each gm contains : Tylosin Tartrate....0.667gm(potency)
說明	<p>適應症 治療因Mycoplasma synoviae菌所引起之雞隻氣囊炎，及因Mycoplasma gallsepticum S6菌所引起之雞或火雞之慢性呼吸器病。</p> <p>用法用量 將150gm之泰樂新水溶性散劑溶入200公升水中，作為家禽唯一飲水來源，連續飲用2~5天。</p>
處方藥別	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗菌劑

Antimicrobial Agents

產品	
製品編號	E041418
品名	泰利美寧48% [®] Trimerin 48% [®] Solution 500ml/Btl
成份	Each ml contains : Sulfadiazine....400mg Trimethoprim....80mg
說明	適應症 治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、巴斯德桿菌症或傳染性可利查 用法用量 雞：在500公升飲水中加入本劑200ml。 豬：在400公升飲水中加入本劑200ml。 連續使用5天或至症狀消失2天後，勿超過14天。
處方藥別	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

產品		
製品編號	E150189	E150127
品名	<p>克寧納斯 0.5%[®] Clinacox 0.5%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>嘜蟲靈 5%[®] Flubendol 5%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">600gm/Tin</p>
成份	<p>Each kg contains: Diclazuril...5 gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Flubendazole...50gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 雞：球蟲病的預防及治療。 兔子：球蟲病的預防及治療。 火雞：球蟲病的治療。</p> <p>用法用量 雞建議劑量： 1. 於穿梭計劃中之後期料，每噸添加本品200gm，相當於1ppm。 2. 於治療球蟲病蔓延時，添加量可提高1.5~2ppm。 兔子建議的用量： 預防及治療兔子腸道及肝臟球蟲病，每噸飼料添加本品200gm，相當於1ppm。</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲、肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲及腎蟲。雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬標準劑量：1. 個別驅蟲時：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2. 集體驅蟲時：驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3. 預防肝白斑時：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞標準劑量：1. 驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用7天。2. 驅除盲腸蟲時：30ppm(600gm/噸)連續使用7天。3. 驅除毛樣線蟲時：20ppm(400gm/噸)連續使用7天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

產品		
製品編號	E150141	N000089
品名	嘑蟲靈 5% [®] Flubenol 5% [®] Powder 18kg/Bag	滅球贊1% [®] Meacozan 1% [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains: Flubendazole....50gm(potency)	Each kg contains: Maduramicin ammonium eq. to Maduramicin....10gm(potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：蛔蟲、肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲及腎蟲。雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 <p>用法用量</p> 豬標準劑量：1.個別驅蟲時：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲時：驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑時：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞標準劑量：1.驅除蛔蟲時：10ppm(200gm/噸)連續使用7天。2.驅除盲腸蟲時：30ppm(600gm/噸)連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲時：20ppm(400gm/噸)連續使用7天。	<p>適應症</p> 肉雞：預防球蟲病。 <p>用法用量</p> 每噸飼料添加產品0.5kg~0.7kg(相當於5ppm~7pp) ※ 停藥期5天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

產品	
製品編號	N040595
品名	滅球靈® Mecozin® Powder 250gm*4Bag
成份	Each g contains: Sodium Sulfachloropyrazine Monohydrate 475.8mg。
說明	<p>適應症 治療雞球蟲病。</p> <p>用法用量 飲水劑之配製：本品用量限為0.03%，將本包裝內含之滅球靈飲水粉劑(250公克)溶於397公升水中，攪勻即可。 用法：依上述配製0.03%飲水劑，當雞隻球蟲病發生時，連續使用3天。</p>
處方藥別	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑

Medicated Feed Additives


產品		
製品編號	E150189	N000089
品名	<p>克寧納斯 0.5%[®] Clinacox 0.5%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>滅球贊1%[®] Meacozan 1%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains: Diclazuril...5gm(potency)</p>	<p>Each kg contains: Maduramicin ammonium eq. to Maduramicin....10gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 雞：球蟲病的預防及治療。 兔子：球蟲病的預防及治療。 火雞：球蟲病的治療。</p> <p>用法用量 雞建議劑量： 1. 於穿梭計劃中之後期料，每噸添加本品200gm，相當於1ppm。 2. 於治療球蟲病蔓延時，添加量可提高1.5~2ppm。 兔子建議的用量： 預防及治療兔子腸道及肝臟球蟲病，每噸飼料添加本品200gm，相當於1ppm。</p>	<p>適應症 肉雞：預防球蟲病。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加產品0.5kg~0.7kg，(相當於5ppm~7ppm) ※ 停藥期5天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑

Medicated Feed Additives

產品		
製品編號	N000498	P611199
品名	泰妙素 20% [®] Tiamulin-200 [®] Powder 1kg/Bag	泰妙素 20% [®] Tiamulin-200 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains: Tiamulin hydrogen fumarate...200gm(potency) (採用coating原料)	Each kg contains: Tiamulin hydrogen fumarate...200gm(potency) (採用coating原料)
說明	<p>適應症</p> 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的預防與治療。 雞：慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 <p>用法用量</p> 豬：流行性肺炎：添加1~2kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天	<p>適應症</p> 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的預防與治療。 雞：慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 <p>用法用量</p> 豬：流行性肺炎：添加1~2kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑

Medicated Feed Additives



產品	
製品編號	E003007
品名	泰黴素-220 [®] Tylosin-220 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains: Tylosin phosphate....220gm(potency)
說明	<p>適應症</p> 雞：促進生長及改進飼料利用效率 產蛋雞：改進飼料利用效率 豬：1.可預防豬赤痢2.促進生長及改進飼料利用效率 <p>用法用量</p> 雞：每噸飼料添加20~250公克 產蛋雞：每噸飼料添加100~250公克 豬：1.預防豬赤痢：每噸飼料添加454~500公克連續餵飼3週後，改用200公克至出售。2.促進生長及改進飼料利用效率：(1)體重60kg以上的豬：每噸飼料添加50~100公克，(2)體重30~60kg的豬：每噸飼料添加100~200公克，(3)體重10~30kg的豬：每噸飼料添加100~500公克。
處方藥別	

家禽用藥品

Poultry Drugs

其他製劑

Other Preparations

產品		
製品編號	N000113	N000319
品名	克嗽靈® Cousorin® Powder 1kg/Bag	克嗽靈® Cousorin® Powder 20kg/Bag
成份	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>
處方藥別	第三類	第三類

補助飼料

Feed Supplements

維生素補助飼料

Vitamin Supplement Feed

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N170032</p>	<p>E170765</p>
<p>品 名</p>	<p>得舒® Detoxol® W.S.Powder 1kg/Bag</p>	<p>益肥王® Ephepan® W.S.Powder 1kg/Tin</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Sorbitol....350mg, Mg....0.48mg Na....57.78mg, Ca....0.54mg K....4.19mg, Cl....78.94mg</p>	<p>Each kg contains : Vit.A....10,000,000I.U. , Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....1,500I.U. , Vit.B1....5gm, Vit.B2....5gm Vit.B6....1gm, Vit.B12....5.5mg, Vit.C....10gm Vit.K3....1.5gm , Panto.....8gm, Niacin....10gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.補充體內電解質，增進營養平衡。 2.增強家禽活力與體力，防止脂肪肝、脫水、尿酸症及各種緊迫現象。 3.防止尿酸沉著所引起腎臟腫大。 <p>用法用量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.用於補充電解質和降低緊迫：每噸飲水添加本品1kg即為稀釋1000倍，連續飲用3~5天。 2.用於防止腎臟腫大，尿酸沉著症和脫水現象：每噸飲水添加本品2kg~5kg即為稀釋200倍~500倍，連續飲用5~7天。 	<p>用法用量</p> <p>魚類：撒本品1,000gm~1,500gm於1公噸的水池中 家禽類：溶解本品0.5~1.0gm於1公升之飲水中 家畜類：溶解本品1.0gm於1公升之飲水中</p>
<p>處 方 藥 別</p>		

補助飼料

Feed Supplements

維生素補助飼料

Vitamin Supplement Feed



產品	
製品編號	P611845
品名	<p>興畜綜合維生素[®] SYT-SV[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>
成份	各種綜合脂溶性與水溶性維生素
說明	<p>用法用量</p> <p>種豬：每噸飼料添加0.6kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg</p>
處方藥別	

補助飼料

Feed Supplements

礦物質補助飼料

Mineral Supplement Feed



<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>P613696</p>	<p>P612877</p>
<p>品 名</p>	<p>育康茁仔豬專用礦物質[®] Eugurt-SPM Premix[®] Powder 25kg/Bag</p>	<p>興畜綜合礦物質[®] SYT-SM[®] Powder 25kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains: Fe....100gm, Zn....100gm Mn....4gm, Cu....5gm I....0.2gm, Se....0.2gm</p>	<p>Each kg contains: Fe....125gm, Zn....100gm Mn....15gm, Cu....20gm I....1gm, Se....0.3gm Co....0.3gm</p>
<p>說 明</p>	<p>用法用量 每噸飼料添加1kg</p>	<p>用法用量 種豬：每噸飼料添加0.7kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg</p>
<p>處方 藥別</p>		

補助飼料

Feed Supplements

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple Vitamin and Mineral Supplement

產品		
製品編號	P612987	E050456
品名	倍多-E120 [®] Better-E120 [®] Powder 20kg/Bag	泌多乳 CDC-A1 [®] CDC-A1 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains: Vit.E....120,000I.U., Biotin....0.06gm Folic acid....2.0gm, Org.Fe....40.0gm Org.Zn....18.0gm, Org.Mn....8.0gm Org.Se....0.2gm, Cr3....0.4gm Bacillus coagulans....1x10E12cfu	Each kg contains: Vit.A....500,000I.U., Vit.D3....100,000I.U. Vit.E....500I.U., Fe....302mg, Cu....255mg Mn....456mg, Zn....1,205mg, Co....12.4mg I....38.2mg, Ca....57.5gm, P....45gm Probiotic
說明	用法用量 每噸飼料添加0.5 kg	用法用量 乳牛：每日每頭100gm，分2次，每次50gm，添加於飼料中混合均勻 乳羊：每日每頭 20gm，分2次，每次10gm，添加於飼料中混合均勻
處方藥別		

補助飼料

Feed Supplements

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple Vitamin and Mineral Supplement

產品		
製品編號	E053552	E170837
品名	泌多乳 CDC-A2 [®] CDC-A2 [®] Powder 20kg/Bag	益肥王-M [®] Ephepan-M [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each 2kg contains: Vit.A....7,000,000I.U., Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....15,000I.U., Fe....50gm, Cu....10gm Mn....60gm, Zn....60gm, Co....0.1gm I....0.6gm, Ca....250gm, P....0.1gm Probiotic	每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素、甲硫胺酸及綜合礦物質。
說明	用法用量 乳牛:每噸飼料添加本品 2 kg 乳羊:每噸飼料添加本品 0.4 kg	用法用量 魚類: 每公噸飼料添加0.5~1kg 家禽類: 每公噸飼料添加1~2kg 家畜類: 每公噸飼料添加1~3kg
處方藥別		

補助飼料

Feed Supplements

綜合維生素、礦物質補助飼料

Multiple Vitamin and Mineral Supplement

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>P613328</p>	<p>E172602</p>
<p>品 名</p>	<p>育康茁仔豬用濃縮預拌精料[®] Eugurt-SPC supplement[®] Powder 20kg/Bag</p>	<p>速美畜[®] SGC-A5-1[®] Powder 20kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>每20公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素、離胺酸、甲硫胺酸、綜合礦物質、綜合酵素與植酸酶。</p>	<p>每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素及綜合礦物質。</p>
<p>說 明</p>	<p>用法用量 仔豬：每噸飼料添加20kg</p>	<p>用法用量 種豬料：每噸飼料添加1kg 教槽料：每噸飼料添加1.5kg 仔豬料：每噸飼料添加1.5kg 肉前料：每噸飼料添加1kg 肉後料：每噸飼料添加0.7~1kg</p>
<p>處 方 藥 別</p>		

補助飼料

Feed Supplements

其他製劑

Other Preparations

產品		
製品編號	N170678	E170071
品名	<p>中化酸寶401[®] Acidtec 401[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>	<p>雷利[®] Realdyme[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>
成份	<p>富馬酸....375g 乳酸....180g 甲酸....100g 丙酸....40g 檸檬酸....10g 賦型劑加足至1kg</p>	<p>Each kg contains:</p> <p>乾物質97.0%，粗蛋白質16.6%，粗纖維9.5% 粗脂肪5.3%，灰份4.9%，離胺酸5.1% 甲硫胺酸2.0%，含硫胺基酸3.5% 羥丁胺酸3.6%，色胺酸1.6%，磷7.1% 鈣1.6%，豬，DE 3,500 kcal/kg</p>
說明	<p>用法用量</p> <p>每噸飼料添加本品3~5公斤或依動物需求添加於飼料中。</p>	<p>用法用量</p> <p>小豬、肉雞、火雞、牛:每噸飼料添加10kg 肉豬:每噸飼料添加5kg 兔:每噸飼料添加10~20kg 種豬、珠雞:每噸飼料添加20kg</p>
處方藥別		

補助飼料

Feed Supplements

其他製劑

Other Preparations

產品		
製品編號	N170159	N170685
品名	斯蜜利 0.04% [®] Strongmix 0.04% [®] Powder 25kg/Bag	維樂黴敏 [®] Vilocym Z [®] Powder 25kg/Bag
成份	Each kg contains: 吡啶甲酸鉻Chromium picolinate (Cr3) 不低於0.4 gm	水合鈉鈣矽酸鋁....285.7g 甘露寡糖....142.9g 丙酸....17.2g 乙酸....5.7g 硫酸銅....11.5g 聚乙烯吡咯烷酮....5.8g 多種植物萃取物....480.4g
說明	用法用量 每噸飼料添加0.5 kg (相當於Cr3 200 ppb)。	用法用量 每噸飼料添加0.75~1.75公斤(依飼料品質適時調整劑量)。
處方藥別		



中國化學製藥動藥處

CCPC <http://www.ccpc.com.tw>



中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031