中化製藥動藥處 製品目錄

2018 PRODUCT CATALOG

CCPC

中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心，為動物鋪上健康之路

Drugs for Pigs and Cattle
牛、豬用藥品

日生研狂犬病不活化疫苗	NISSEIKEN Rabies TC vaccine	Injection	1
安蒙西林－150懸濁注射液	Amoxicillin-150	Injection	2
安西林鈉乾粉注射劑	Ancillina	Injection	2
配尼濁懸濁注射液	Penisol	Injection	3
配尼黴素－S 懸濁注射液	Penimycin-S	Injection	3
讚配尼〝長效〞懸濁注射液	Paurain LA	Injection	4
賜福克寧注射劑	Cekunome	Injection	4
林可黴素－300注射液	Lincomycin-300	Injection	5
可賜興-150注射劑	Cotusin-150	Injection	5
益樂富10%注射劑	Enroxacin 10%	Injection	6
獲利欣－300注射劑	Floricin-300	Injection	6
獲利欣10%	Floricin 10%	Solution	7
全達口服液	Gentacin	Oral Sol.	7
嘉黴素－100注射液	Kanamycin-100	Injection	8
嘉黴素－250注射液	Kanamycin-250	Injection	8
泰樂新注射液	Tylosin	Injection	9
泰樂新20%注射劑	Tylosin 20%	Injection	9
賜福晶靈滅菌懸劑	Ceftiofur CFA	Injection	10
賜福咳寧乾粉注射劑	Ceftiofur Sodium	Injection	10
賜福肺清滅菌懸劑	Ceftiofur Hcl	Injection	11
萬靈素軟膏劑	Oxineomycin	Ointment	12
新萬靈素軟膏劑	Tetraneomycin	Ointment	12
舒美淨33⅓%注射液	Sumezin 33⅓%	Injection	13
泰利美寧注射劑	Trimerin	Injection	13
泰利美寧48%口服懸液劑	Trimerin 48%	Oral Susp.	14
唬滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	15

Drugs for Pigs and Cattle
牛、豬用藥品

唬滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	15
易滅蟲注射劑	Ivermectin	Injection	16
易滅蟲0.5%澆滴劑	Ivermectin 0.5% pour-on	Solution	16
易滅蟲0.6%散劑	Ivermectin 0.6%	Powder	17
樂蟲滅散	Lepicom	Powder	17
特球除5%	Toltracox 5%	Oral Susp.	18
舒爾必寧50%注射液	Sulpyrin 50%	Injection	19
新感冒靈－S注射液	Neo-Coldenin S	Injection	19
力克爽注射液	Dexamethasone	Injection	20
賜鎮注射劑	Stin	Injection	20
特威鎮注射劑	Tolvetin	Injection	21
福力鎮 5%長效注射劑	Fluliten	Injection	21
安期B－25消毒劑	Anti B-25	Solution	22
百潔碘－30消毒劑	Biodyne-30	Solution	22
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	23
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	23
血能補－100注射液	Inoplex-100	Injection	24
美極命－G注射液	Methimin-G	Injection	24
維畜鈣注射液	Polycalcium	Injection	25
保畜維他注射液	Polyvita	Injection	25
複方維他命B注射液	Vitalex	Injection	26
賜滅痢注射液	Smelin	Injection	26
通血能200注射劑	Tonkey 200	Injection	27
催產素注射劑	Oxytocin	Injection	28
畜舒坦	Stroless	Injection	29
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	30

Drugs for Pigs and Cattle
牛、豬用藥品

安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	30
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	31
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	31
賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	32
賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	32
可立使淨－110	Colistin-110	Powder	33
林可黴素－110	Lincomycin-110	Powder	33
林可黴素－220	Lincomycin-220	Powder	34
林可黴素 40%	Lincomycin 40%	W.S.Powder	34
可賜興－220	Cotusin-220	Powder	35
可賜興－666	Cotusin-666	W.S.Powder	35
多欣－200	Doxin-200	W.S.Powder	36
肥力王－VN	Feradox-VN	W.S.Powder	36
獲利欣 1%	Floricin 1%	Powder	37
獲利欣10%	Floricin 10%	Powder	37
羥四環素－220	Oxytetracycline-220	Powder	38
羥四環素－500	Oxytetracycline-500	W.S.Powder	38
泰康欣－200	Tiacosin-200	Powder	39
泰康欣 250	Tiacosin 250	Solution	39
泰樂新AT-50散劑	Tylosin AT-50	Powder	40
泰利美寧	Trimerin	Powder	40
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	41
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	41
泰黴素－220	Tylosin-220	Powder	42
克嗽靈	Cousorin	Powder	43
克嗽靈	Cousorin	Powder	43

Drugs for Pigs and Cattle
牛、豬用藥品

長生精精液稀釋劑	Semengra Semen Extender	Powder	44
速保精Ⅱ精液稀釋液	Sperm-up Ⅱ	Solution	44

Pet Drugs
伴侶動物用藥品

舒爾利軟膏劑	Surefit	Ointment	45
富樂－B液	Hope-B Drops	Drops	46
滴爾易懸液劑	Earzi	Suspension	47
滴爾易懸液劑	Earzi	Suspension	47
輕鬆洗 外用液劑	Easywash	External s	48
芝波洗髮精20公絲	Ketoconazole 2%	Shampoo	48
舒聰敏	Suroclean	Drops	49
力停疼25毫克	Painoff Caplets 25mg	Tablet	50
力停疼75毫克	Painoff Caplets 75mg	Tablet	50

Poultry Drugs
家禽用藥品

泰利美寧	Trimerin	Powder	51
泰利美寧48%	Trimerin 48%	Solution	51
唬滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	52
唬滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	52
樂蟲滅散	Lepicom	Powder	53
特球除2.5%	Toltracox 2.5%	Oral Sol.	53
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	54
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	54
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	55
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	55
賜福素散	Cephalin	Powder	56
賜福素散	Cephalin	Powder	56
可立使淨－120	Colistin-120	Powder	57
林可黴素 40%	Lincomycin 40%	W.S.Powder	57
可賜興－666	Cotusin-666	W.S.Powder	58
多欣－200	Doxin-200	W.S.Powder	58
雅黴素飲水劑	Erymycin WSP 500	W.S.Powder	59
獲利欣10%	Floricin 10%	Solution	59
泰康欣 250	Tiacosin 250	Solution	60
富鯤口服液20%	Furich Sol. 20%	Solution	60
泰樂新水溶性散	Tylosin WSP	W.S.Powder	61
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	62
泰妙素 20%	Tiamulin 20%	Powder	62
克嗽靈	Cousorin	Powder	63
克嗽靈	Cousorin	Powder	63

Nutritional supplement
營養保健

益肥王	Ephepan	W.S.Powder	64
興畜綜合維生素	SYT-SV	Powder	64
興畜綜合礦物質	SYT-SM	Powder	65
倍多－E120	Better-E120	Powder	66
泌多乳 CDC－A1	CDC-A1	Powder	66
泌多乳 CDC－A2	CDC-A2	Powder	67
益肥王－M	Ephepan-M	Powder	67
速美畜	SGC-A5-1	Powder	68
育康茁仔豬用濃縮預拌精料	Eugurt-SPC supplement	Powder	68
倍多保	Bacispore	Powder	69
倍多保	Bacispore	Powder	69
益賜寶	Genspore	Powder	70
得舒	Detoxol	W.S.Powder	70
利舒坦	Reliever	Solution	71
蔘果葳60	Sangrovit 60	Powder	71
維能肝	Silyvita	Powder	72
動物用維能肝濃縮液	Silyvita	Solution	72

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

疫苗

Vaccine

產品	
製品編號	P614422
品名	日生研狂犬病不活化疫苗 ® NISSEIKEN Rabies TC vacc ® Injection 10mL/Vial
成份	Each mL contains： HmLu細胞培養狂犬病病毒RC˙HL株 107.5 TCID50 以上 Thimerosal 0.1 mg 以下 磷酸緩衝食鹽水 殘量
說明	適應症 預防犬、貓之狂犬病。 用法用量 每隻狗及貓皮下注射或肌肉注射1ml。
處方藥別	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E000853	E000115
品名	安蒙西林－150懸濁注射液 ® Amoxicillin-150 ® Injection 100mL/10vial	安西林鈉乾粉注射劑 ® Ancillina ® Injection 12.5gm/10vial
成份	Each mL contains ： Amoxicillin Trihydrate....150mg(potency)	Each vial contains： Ampicillin Sodium....12.5gm(potency)
說明	適應症 治療由革蘭氏陽性、陰性菌感染所引起之放線菌病、惡性水腫、沙氏桿菌症、氣腫疽 、豬丹毒、出血性敗血症、大腸桿菌症及一般化膿症。 用法用量 以皮下或肌肉注射方式投予動物，使用前必須充份搖晃瓶子，使懸浮液均勻。一般建議量為每天一次，每公斤體重7mg(力價)，或每5公斤體重注射0.25mL，連續治療3~5天。 ※停藥期：10 天，乳汁：24小時。	適應症 治療家禽畜由鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、變形菌等引起之感染症。 用法用量 以注射用水溶解後行肌肉注射。 1.家畜：按體重每公斤每日注射l0~20mg， 2~3天，嗜血桿菌症30 mg。視動物種類、體重、症狀，增減劑量。 2.家禽：按體重每公斤每日注射10~20mg 2~3天。 ※停藥期：5 天，乳汁：72小時。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E002336	E002123
品名	配尼濁懸濁注射液 ® Penisol ® Injection 100mL/10vial	配尼黴素－S 懸濁注射液 ® Penimycin-S ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Procaine Penicillin G....300,000 I.U	Each 2mL contains： Procaine Penicillin G....400,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....0.5gm(potency)
說明	適應症 革蘭氏陽性菌、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌、淋菌、髓膜炎菌、瓦斯壞疽菌、放線菌、炭疽菌引起之各種疾患。外傷、火傷感染、手術前後之感染。 用法用量 按體重每公斤注射 4,000 ~ 8,000 I.U. (0.013~ 0.027mL)，依症狀增減，每日一次施行肌肉深部注射，連續治療3~5天。 乳房炎治療：牛：每一乳房每次注入300,000~1,000,000 I.U.每日施用一次，依症狀增減劑量。羊：劑量按牛減半施用。 本劑灌注乳房後48小時內，牛羊奶不可飲用。 ※停藥期：14天。	適應症 各型革蘭氏陽性菌與陰性菌混合感染症、肺炎、肺疫、腸炎、下痢、丹毒、化膿症、乳房炎、中耳炎、子宮內膜炎、心內膜炎、關節炎、產褥熱、運輸熱、火傷、腺疫、尿道感染症、破傷風、犬瘟熱二次感染症、家兔梅毒、炭疽菌症、放線菌症、螺旋鉤端體症及其他各種炎症。 用法用量 家畜：牛、馬 10~30mL。大豬 4~10mL。中豬 2~4mL。小豬 1~2mL或每公斤0.02~0.04mL計算。 家禽：0.05~0.5mL/隻。 依體重症狀增減行肌肉注射，連續治療2~3天。 ※停藥期：14天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E001342	E612065
品名	讚配尼〝長效〞懸濁注射液 ® Paurain LA ® Injection 100mL/10vial	賜福克寧注射劑 ® Cekunome ® Injection 100mL/vial
成份	Each mL contains： Benzathine Penicillin G....100,000 I.U. Procaine Penicillin G....100,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....200mg (potency)	Each mL contains： Cefquinome(sulfate)...25mg
說明	適應症 豬、牛、馬：治療細菌性肺炎、豬丹毒、敗血症、子宮炎、乳房炎、母豬無乳症候群 (MMA)。 用法用量 豬、馬及牛：每100kg體重，每三天肌肉注射5~10mL。 仔豬、仔馬、仔牛及小動物：每25公斤體重，每三天肌肉注射1~ 2mL。 ※停藥期：肉用：10 天，乳用：擠乳10次。	適應症 作為牛隻與豬隻細菌感染之治療藥劑，可有效控制對cefquinome具感受性之革蘭氏陽性及陰性菌感染。 用法用量 牛:呼吸道感染、腐蹄病、蹄葉炎。具全身性症狀之大腸桿菌性乳房炎。2mL/50kg BW，IM，連續治療3~5天。 犢牛:大腸桿菌性敗血症， 4mL/50kg BW，IM，連續治療3~5天。 豬:呼吸道感染、乳房炎/子宮炎/無乳症(MMA)，2mL/25kg BW，IM，連續治療2~3天。 仔豬:腦膜炎、關節炎、表皮炎，2mL/25kg BW，IM，連續治療5天。 ※停藥期：牛：5天，乳汁：1天。豬：3天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑
Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E000509	E000011
品名	林可黴素－300注射液 ® Lincomycin-300 ® Injection 100mL/10vial	可賜興-150注射劑 ® Cotusin-150 ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Lincomycin HCL....300mg(potency)	Each ml contains： Lincomycin Hydrochloride..... 50mg (potency) Spectinomycin Sulfate.....100mg (potency)
說明	適應症 治療革蘭氏陽性菌及其它具感受性細菌所引起之感染症：如細菌性肺炎、氣管炎、CRD、可利查、中耳炎、膿胸、細菌性腦膜炎、蜂窩組織炎、膿瘍、細菌性敗血症、放線菌症。 用法用量 按體重每公斤10~20mg之用量每日1~2次，依症狀增減。行肌肉注射或靜脈注射投藥，每日一次。 ※停藥期：7天。	適應症 ◎豬：治療感受性細菌所引起之傳染性關節炎，感受性細菌。◎雞及火雞：治療鷗漿菌屬和/或大腸桿菌感染引起之氣囊病，家禽霍亂，雛火雞的阿利桑納(副結腸)感染，以及葡萄球菌感染。◎犬：治療呼吸道感染，皮膚病，尿路感染，以及續發性細菌性感染。 用法用量 ◎豬：治療關節炎、腸炎或鷗漿菌性肺炎， 1mL/10kg BW，IM，連續 3~7天。放線桿菌胸膜肺炎，0.2mL/kg BW，連續3天。◎雞及火雞：0.2mL/kg BW，SC，連續3天。◎犬：1mL/5kg BW，IM，每天1~2次。 ※停藥期：21天，雞16週齡以上、產蛋中之蛋雞不得使用。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E000224	E001713/N001561
品名	益樂富10%注射劑 ® Enroxacin 10% ® Injection 100mL/10vial	獲利欣－300注射劑 ® Floricin-300 ® Injection 100mL/vial/10vial
成份	Each mL contains： Enrofloxacin.....100mg	Each mL contains： Florfenicol....300mg
說明	適應症 治療牛、豬因革蘭陰性菌、革蘭陽性菌及黴漿菌等所引起之感染症。牛：由細菌感染所引起的呼吸器官及消化道疾病以及由病毒感染後所引起之二次感染。豬：呼吸道或消化道感染(巴氏桿菌症，黴漿菌症，大腸菌下痢，大腸菌性敗血症，沙門氏菌症)。複雜性疾病如萎縮性鼻炎，地方性肺炎及MMA徵候群等。馬：禁止使用。 用法用量 一般對於牛(體重250公斤以上，皮下注射)及豬(肌肉注射)，每100公斤體重注射2.5mL。如果是嚴重的呼吸道感染或沙門氏菌症，劑量可增加至每100公斤注射5mL。 ※停藥期：8天。	適應症 治療對Florfenicol敏感之病菌感染。牛：治療因Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophillus somnus引起的呼吸道感染。豬：治療因Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae引起的呼吸道感染。 用法用量 牛：1mL/15kg BW，IM，注射2劑，間隔48小時。2mL/15kg BW，SC，使用16號針頭注射一劑。每一注射部位的注射劑量不得超過10mL。 豬：1mL/20kg BW，IM，注射2劑，間隔48小時。 ※停藥期：牛：肉用牛：肌肉注射30天，皮下注射44天。乳牛：泌乳期間禁止使用。豬：肉用：14天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑
Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E001706/E001490	E031156
品名	獲利欣10% ® Floricin 10% ® Solution 500mL/1000mL	全達口服液 ® Gentacin ® Oral Sol. 160mL/10vial
成份	Each mL contains： Florfenicol....100mg	Each mL contains： Gentamicin Sulfate....6.25mg(potency)
說明	適應症 治療豬放線桿菌胸膜肺炎及雞大腸桿菌症。 用法用量 豬:每日每公斤體重投與本品0.01mL~0.02mL相當於Florfenicol 1~2 mg(即本品0.01mL~0.02mL)之量，加入飲水混合後經口投與。雞每日飲水的1/4至1/2中，以每公斤體重投與本品0.2mL(相當於Florfenicol 20mg)，加入飲水混合後經口投與，連續使用五天。 ※停藥期：豬：3天，雞：5天，土番鴨：14天，雞16週齡以上，產蛋中之蛋雞不得使用。	適應症 治療1~3日齡出生小豬之大腸桿菌症，感染性下痢。 用法用量 將Pump的白色塑膠管開口置於小豬的舌根，用力壓縮Pump一次(每壓縮一次約0.8ml，相當於Gentamycin 5mg的力價)，通常小豬只須服用1次劑量，即可見效。 ※停藥期：屠宰食用乳豬，須停用本劑至少14天後行之。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑
Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E001294	N001224
品名	嘉黴素－100注射液 ® Kanamycin-100 ® Injection 100mL/10vial	嘉黴素－250注射液 ® Kanamycin-250 ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Kanamycin Sulfate....100mg(potency)	Each mL contains： Kanamycin Sulfate….250mg(potency)
說明	適應症 急慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。 用法用量 按體重每公斤10~30mg，每日一次行肌肉注射或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。 ※停藥期：30天。	適應症 治療家畜: 1.呼吸道感染症-肺炎(肺疫)、支氣管炎。2.生殖泌尿道感染症-子宮內膜炎。3.消化道感染症-細菌性下痢(腸炎)。4.一般化膿性疾患-由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌或綠膿菌引起之膿痂疹、蜂窩織炎、淋巴結炎、膿瘍、乳房炎、中耳炎、骨髓炎。5.其他-豬丹毒、犬瘟熱二次感染、關節炎、手術前後之感染。 用法用量 1.牛、馬、山羊、綿羊: (每公斤體重:0.02~0.04mL)。 2.豬、狗、貓、兔、家禽: (每公斤體重:0.04~0.08mL)。 每日一次施行肌肉或皮下注射，可連續用2~3天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E003746	N001145
品名	泰樂新注射液 ® Tylosin ® Injection 100mL/10vial	泰樂新20%注射劑 ® Tylosin 20% ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Tylosin Tartrate....50mg (potency)	Each mL contains: Tylosin.....200mg(potency)
說明	適應症 對禽畜革蘭氏陽性、陰性，類胸膜炎細菌(P.P.L.O.)引起之疾患均具藥效。家禽之慢性呼吸道疾病、支氣管炎、喉炎、肺炎、細菌性感染症。家畜之肺炎、白喉、子宮炎、腐蹄症、豬丹毒、細菌性下痢及手術或創傷後併發感染症。 用法用量 牛：每50kg體重2~4mL 豬：每50kg體重2~8mL 初生豬：每kg注射0.2~0.5mL 家禽：每kg注射0.2~0.5mL 每日一次，按體重症狀增減行肌肉注射。 ※停藥期：牛：8天，豬：4天，肉雞：3天，火雞：5天，乳汁：96小時。	適應症 牛、綿羊、山羊、豬、狗： 呼吸道疾病。 豬：壞死性腸炎 、紅斑、地方性支氣管炎、赤痢。 綿羊、山羊：乳房炎、子宮內膜炎、傳染性無乳症。 母牛、綿羊：初期黴漿菌關節炎、弧菌病。 小牛、母牛：指頭膿炎、耳炎、傳染性傷口、鉤端螺旋體症、傳染性結膜炎。 用法用量 肌肉注射，一處勿施打超過10mL，每天1次，連續3~5 天。 牛：每100公斤體重使用2~5mL。小牛：每50公斤體重使用2.5mL。綿羊、山羊：每50公斤體重使用3mL。豬、狗：每50公斤體重使用2.5mL。 ※停藥期：食用肉、乳品：5天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑
Antimicrobial agent

產品		
製品編號	P614381	P614367
品名	賜福晶靈滅菌懸劑 ® Ceftiofur CFA ® Injection 100mL/vial	賜福咳寧乾粉注射劑 ® Ceftiofur Sodium ® Injection 4gm/10vial
成份	Each mL contains： Ceftiofur (Crystalline Free Acid Micronized) .....100mg(Pot.)	Each vial contains： Ceftiofur Sodium.....4gm (pot.)
說明	適應症 豬：治療因胸膜肺炎放線桿菌、敗血性巴氏桿菌、副豬嗜血菌及豬鏈球菌引起的呼吸道疾病。 用法用量 以肌肉注射本劑於豬隻耳後頸處。每公斤體重投予單一劑量 5mg 的 Ceftiofur，相當於每 20 公斤體重使用 1mL 本劑。同一注射部位不可注射超過 2mL 本劑，以免造成殘留。40 公斤以上之豬隻 則需分成二次以上注射。大部份動物於投藥後 3-5 天即產生療效。若未見改善，則應重新診斷。 ※停藥期:18天。	適應症 豬：治療由胸膜肺炎放線桿菌、溶血性巴斯德桿菌、豬霍亂沙氏桿菌和豬鏈球菌二型等廣泛的 G(+) 及 G(-)敏感性細菌所引起的豬隻呼吸道疾病。 牛：治療牛呼吸道疾病(運輸熱及細菌性肺炎)、溶血性巴斯德桿菌、血性巴斯德桿菌和嗜血桿菌 的混合感染症。 用法用量 豬：以注射用蒸餾水100ml稀釋，標準劑量為每日每公斤體重 2mg，連續使用 1 至 3 天。 牛：以注射用蒸餾水80ml稀釋，標準劑量為每日每公斤體重 1mg，作一次深部肌肉注射，每天 1 次，連續使用 3 天至 5 天。 ※停藥期: 牛 5 天，豬 3 天。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品	
製品編號	P614374
品名	賜福肺清滅菌懸劑 ® Ceftiofur Hcl ® Injection 100ml/10vial
成份	Each mL contains： Ceftiofur (hydrochloride).....50mg
說明	適應症 豬隻及成年牛隻:治療由胸膜肺炎放線桿菌、巴斯德桿菌和嗜血桿菌引起之呼吸道疾病，由壞死性 梭菌及黑色素生成菌引起之蹄真皮炎、子宮炎及對 Ceftiofur 具感受性細菌引起之感染。 用法用量 豬隻：每 50 公斤體重肌肉注射 1-3mL，每 24 小時注射一次，連續 3 天。 牛隻：每 50 公斤體重肌肉或皮下注射 1-2mL，每 24 小時注射一次，連續 3-5 天。※停藥期: 肉豬 48 小時；肉用牛：48 小時；牛乳 0 天。
處方藥別	第二類

產品		
製品編號	E001483	E001469
品名	萬靈素軟膏劑 ® Oxineomycin ® Ointment 7.5gm/60's	新萬靈素軟膏劑 ® Tetraneomycin ® Ointment 8.0gm/60's
成份	Each syringe contains： Oxytetracycline HCL....200mg (potency) Neomycin Sulfate....25mg (potency) Sulfathiazole....150mg Hydrocortisone Acetate....20mg	Each syringe (8gm) contains： Tetracycline Hydrochloride....200mg(Potency) Neomycin Sulfate....250mg(potency) Bacitracin....2000I.U.(potency) Prednisolone....10mg
說明	適應症 治療因葡萄球菌、鏈球菌及其它感染性細菌引起之乳房炎。 用法用量 1.對鏈球菌引起之無乳性乳房炎：每一乳房每次注入1支。 2.對葡萄球菌性乳房炎：每一乳房每次注入1支，每隔48小時連續施用，直到乳房及乳液恢復正常。 3.對其他感染性細菌所引起之乳房炎：每一乳房每次注入1支，每隔24小時，連續施用直到乳房及乳液恢復正常。 ※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。	適應症 乳房炎之治療，包括由大腸桿菌、葡萄球菌所引起之乳房炎。 用法用量 在擠完乳汁後，並清洗乳頭後，立即於感染乳房內注入1支本劑，如有必要可於24 小時後重覆治療1次。 ※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。
處方藥別	第三類	第三類

產品		
製品編號	E043025	E043362
品名	舒美淨33⅓%注射液 ® Sumezin 33⅓% ® Injection 100mL/10vial	泰利美寧注射劑 ® Trimerin ® Injection 100mL/10vial
成份	Each 100mL contains： Sulfamethazine Sodium....33.3gm	Each mL contains： Trimethoprim....40mg Sulfadiazine....200mg
說明	適應症 早發性大腸桿菌、球蟲症、流行性感冒、產褥熱、子宮內膜炎、陰道炎等各種細菌感染症。 用法用量 牛、馬：20~40 mL。 豬、羊： 5~20 mL。 犬、貓： 2~5 mL。 或按體重初劑量每公斤0.3~0.6 mL，維持劑量減半。 每日一次，施行靜脈、肌肉或腹膜注射；但羊及綿羊則每日注射二次。 ※停藥期：10天，乳汁：96小時。	適應症 具廣泛之抗菌效果及療效。 呼吸系統：肺炎、氣管炎、支氣管炎。消化疾病：細菌性白痢、胃腸炎。泌尿生殖疾病：子宮炎、陰道炎、產褥熱、腎炎、膀胱炎等。原蟲疾病：弓蟲症。一般感染：敗血症、細菌性泌乳缺乏症、創傷感染、手術及生產後細菌感染。 用法用量 一般動物行肌肉注射(請勿靜脈注射)，按體重每公斤注射0.06~0.1 mL，每日一次；視病症酌情增減劑量，必要時可於24~48小時後重複注射。 ※停藥期：10天。
處方藥別	第二類	第二類

產品	
製品編號	E041418
品名	泰利美寧48%口服懸液劑 ® Trimerin 48% ® Oral Susp. 500mL/Btl
成份	Each mL contains： Sulfadiazine....400mg Trimethoprim....80mg
說明	適應症 雞：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症、傳染性可利查及其它二次性細菌感染。 豬：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症。 用法用量 雞：每2.5公升飲水加入本劑1毫升或在500公升之飲水槽中加入本劑200mL。 豬：每2公升飲水加入本劑1毫升或在400公升之飲水槽中加入本劑200mL。 連續投藥5天或使用至症狀消失2天後，勿超過14天。 ※停藥期：5天。
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

產品		
製品編號	N151330	N151323
品名	唬滅諾 5% ® Flumeizole 5% ® Powder 600gm/Bag	唬滅諾 5% ® Flumeizole 5% ® Powder 25kg/Bag
成份	Each kg contains： Flubendazole....50 gm(potency)	Each kg contains： Flubendazole....50 gm(potency)
說明	適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 用法用量 豬：1.個別驅蟲：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲： 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1.驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2.驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。	適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 用法用量 豬：1.個別驅蟲：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲： 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1.驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2.驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑
Anthelmintics

產品		
製品編號	E150574	N151165
品名	易滅蟲注射劑 ® Ivermectin ® Injection 100mL/1vial	易滅蟲0.5%澆滴劑 ® Ivermectin 0.5% pour-on ® Solution 500mL/Btl
成份	Each mL contains： Ivermectin....10mg	Each 100mL contains： Ivermectin.....5mg
說明	適應症 控制及治療豬之內、外寄生蟲。 用法用量 豬以頸部皮下注射行之，按體重每33公斤注射1mL。 建議治療計畫: 1.種豬：如欲開始進行寄生蟲防治計劃，需將場內所有豬隻全部治療，然後再依下列計劃進行： 母豬：分娩前7 至14 天間予以注射，可減少感染仔豬之危險。 女豬：配種前7 至14 天間予以注射；分娩前7 至14 天間予以注射。 公豬：視其場內污染程度而定；每年至少注射兩次。 ※停藥期：28天。	適應症 牛：治療和控制內寄生蟲和外寄生蟲。 用法用量 本產品每mL含有5mg的Ivermectin，每公斤體重建議使用500μg˜的Ivermectin之劑量，溶液必須沿著牛隻背部從肩胛骨間隆起的部份澆滴到尾部。 推薦劑量：每10公斤體重使用1mL。
處方藥別	第二類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑
Anthelmintics

產品		
製品編號	N150700	N151000
品名	易滅蟲0.6%散劑 ® Ivermectin 0.6% ® Powder 333gm/Bag	樂蟲滅散 ® Lepicom ® Powder 1kg/Bag
成份	Each gm cantains： Ivermectin.....6mg	Each gm contains： Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....100mg
說明	適應症 豬隻控制及治療內、外寄生蟲，其作用範圍如下: 一、外寄生蟲: 1.豬穿孔疥癬蟲。2.吸血性豬蝨。 二、內寄生蟲: 1.豬肺蟲的成蟲。2.豬腎蟲第四期的幼蟲及成蟲。3.豬胃、腸內圓蟲: (1)豬蛔蟲:成蟲及第四期幼蟲。(2)紅色毛樣線蟲:成蟲及第四期幼蟲。(3)藍松氏豬棍線蟲:成蟲。 用法用量 40公斤以下之仔豬及肉豬:每噸飼料添加本劑一包(333gm)，連續餵食7天。 40公斤以上至100公斤以下:每噸飼料添加本劑400gm，連續餵食7天。 ※停藥期: 14天。	適應症 豬：蛔蟲及其移行性幼蟲，肺蟲、鞭蟲、腸類圓蟲(淡紅豬圓蟲及結節線圓蟲屬)、類腸圓蟲(藍森棍蟲)。 牛、羊：肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、結節線圓蟲、枯貝氏蟲、線蟲。 家禽：蛔蟲、雞盲腸蟲、毛細線蟲。 用法用量 豬：依下列用量溶於飲水中，體重100公斤以下，每20公斤體重給予1公克，體重100公斤以上，每頭給予5公克。 牛：每200公斤體重給予10公克溶於水中灌服。 家禽：每公斤體重給0.2~0.25公克溶於飲水中。 ※停藥期: 7天，乳品: 72小時。
處方藥別	第三類	第三類

產品	
製品編號	N201178
品名	特球除5% ® Toltracox 5% ® Oral Susp. 160 mL/10 Btl
成份	Each mL contains： Toltrazuril.....50.0mg
說明	適應症 Toltrazuril對球蟲在無性生殖期及有性生殖之各階段均具殺滅效果。對球蟲具全期殺滅效果正是本劑獨特的作用模式。 主治效能 豬:對於預防經常發生豬球蟲(Isospora suis)所引起球蟲病的豬場，可預防其新生仔豬球蟲病臨床病狀的發生。 用法用量 本品之治療須單獨投予每隻動物體。 每隻3~5日齡之仔豬口服投予一劑，劑量為每公斤體重20mg Toltrazuril(相當於每公斤體重使用0.4mL Toltracox 5%)。若於球蟲症爆發時再使用本藥劑治療，則有可能因動物的小腸已發生病變而效果不彰。 ※停藥期：豬(仔豬)可食用組織：上市前77天。
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛消炎劑
Antipyretics & Analgesics

產品		
製品編號	E122951	E111753
品名	舒爾必寧50%注射液 ® Sulpyrin 50% ® Injection 100mL/10vial	新感冒靈－S注射液 ® Neo-Coldenin S ® Injection 100mL/10vial
成份	Each vial contains： Sulpyrin....50%	Each mL contains： Chlorpheniramine Maleate....2.5mg dl-Methyl Ephedrine HCL....20mg Sulpyrin....150mg
說明	適應症 1.減輕所有動物之腸絞痛、腰肌痛、分娩、由分娩引起之子宮頸口痙攣、僂麻質斯、神經炎、神經痛，小動物之胃炎，防止嘔吐，炎症及其他一切熱性疾病之鎮痛解熱。 2.馬：減輕疼痛、鬆弛腸痙攣、刺激腸蠕動、解除不安及診療時之抵抗、腰痛、強直症(破傷風)。 3.牛、馬、豬、山羊、綿羊：異物性食道梗塞症。 4.豬：漿膜炎、關節炎。 用法用量 牛：8mL/100kg BW。馬：20~60 mL。犢、幼獸：5~15 mL。豬：10~30 mL。羊：2~8 mL。犬、貓：1~5 mL。 按體重症狀增減，每日1~2次，最好施行靜脈注射或肌肉、靜脈混合注射亦可。	適應症 一般感冒、伴有發熱咳嗽之感冒、流行性感冒、肺炎、支氣管炎、咳嗽、氣喘、傷寒及其它疾病引起之發熱疼痛均可使用。 用法用量 牛、馬：(大)10~25 mL，(小)：5~10 mL 大豬：5~10mL 中豬：2~5mL 小豬：0.5~2mL 羊、犬、貓：1~5mL 雞、火雞(不含蛋雞)：每公斤0.1 mL 按體重症狀每日1~2次，行皮下或肌肉注射。 重症時配合化學治療法製劑使用，效果更佳。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛消炎劑
Antipyretics & Analgesics

產品		
製品編號	E060543	E121565
品名	力克爽注射液 ® Dexamethasone ® Injection 100mL/10vial	賜鎮注射劑 ® Stin ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Dexamethasone Sodium Phosphate eq.to Dexamethasone Phosphate....1mg	Each mL contains： Phenylbutazone....200mg Sodium salicylate....20mg
說明	適應症 酮症(Ketosis)、產前產後之後肢麻痹、喘息、支氣管炎、肺炎、神經痛、過敏性皮膚炎、犬瘟熱初期炎症之緩解。 用法用量 牛：10~30 mL。馬： 5~20 mL。 羊： 5~10 mL。大豬：5~10mL。 中豬：3~5 mL。小豬：0.5~2 mL。 犬：0.25~2 mL。貓、兔：0.125~0.5mL。 每日一次，施行皮下、肌肉或靜脈注射。 ※停藥期：5天。	適應症 牛、馬、豬：傳染性疾病、外傷、風濕性關節炎與急性肺器官感染之抗炎作用。 用法用量 對靜脈或肌肉行慢速注射。 大動物：治療的前兩天，使用20~30 mL，兩天後改用20 mL，以後則降為10 mL。 小馬小牛：前兩天10 mL，兩天後則用6 mL。 豬：每日以10~15 mL，行肌肉注射。 ※停藥期: 牛：15天，其他肉類動物：3天，乳用：4次擠乳(用藥後4次之擠乳，不得供人食用)。
處方藥別	第二類	第二類

產品		
製品編號	N611056	N121076
品名	特威鎮注射劑 ® Tolvetin ® Injection 100mL/12vial	福力鎮 5%長效注射劑 ® Fluliten ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Tolfenamic acid....40mg	Each mL contains: Flunixine (Meglumine type).....50mg
說明	適應症 本劑為一消炎、鎮痛、解熱劑。 牛：併用治療呼吸疾病相關之急性炎症及急性乳房炎。 豬：併用治療子宮炎、乳房炎及無乳症徵候群。 用法用量 牛： 呼吸疾病：肌肉注射每公斤2毫克，相當於每20公斤1mL，48小時後再重覆施打一次。 乳房炎：單一次靜脈注射，每公斤體重4毫克。 豬：肌肉注射每公斤2毫克，相當於每20公斤體重1mL。 ※停藥期：豬：肉14天，牛：肉12天，牛奶：1天(2次榨乳後)。	適應症 牛：肉牛和乳牛：消炎解熱，亦可用於內毒素休克。強效鎮痛，特別是腸絞痛。有效抑制分泌過盛。 豬：消炎鎮痛，針對母豬之乳腺炎—子宮炎—無乳症(M.M.A.)藥效最佳。 用法用量 牛：緩慢靜脈或肌肉注射，每50公斤體重注射2mL/日或1mL/間隔12小時，最多連續治療3天。 豬：肌肉注射，每50公斤體重注射2mL/日，最多連續治療3天。 ※停藥期：牛乳：12小時，馬：10天，牛：15天，豬：21天。
處方藥別	第二類	第二類

產品		
製品編號	E141615	E140267
品名	安期B－25消毒劑 ® Anti B-25 ® Solution 4L	百潔碘－30消毒劑 ® Biodyne-30 ® Solution 3.8L
成份	Each mL contains： Benzalkonium Chloride....250mg	Each mL contains： Available Iodine (Nonoxynol-9 Iodine 20%)....30mg
說明	適應症 本品主成份Benzalkonium Chloride 是一種陽離子界面活性劑，為目前最理想的消毒劑之一，在各國藥典及其他重要醫藥書籍中，均有詳細記載與推薦。可用於一般消毒、傷口沖洗、殺菌及消除黴菌、病毒的感染。 消毒殺菌劑、雞舍、豬舍、畜體、水池、鰻池、農牧場舍、手術器具之清潔殺菌消毒。 用法用量 畜舍消毒：800~1200倍噴洗。 器皿消毒：500~1000倍浸洗。 水池消毒：2000~4000倍。	適應症 本品適用於禽、畜舍之豬傳染性胃腸炎(TGE)、傳染性支氣管炎(IB)、慢性呼吸器病(CRD)、新城雞病(ND)、假性狂犬病(PR)、豬水泡病(SVD)等病原、畜體、禽畜用器具等之消毒。 用法用量 稀釋倍數，請詳閱說明書。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

消毒劑
Disinfectant

產品		
製品編號	E091248	E140092
品名	碘浴寶消毒液 ® Iodiper ® Solution 5L	碘浴寶消毒液 ® Iodiper ® Solution 20L
成份	Each mL contains： Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg	Each mL contains： Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg
說明	適應症 在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及榨乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。 用法用量 1.本品為一現成的乳頭浸浴溶液，不需稀釋，即可做為乳頭浸浴或噴霧。 2.乳房清洗：(75ml本溶液加4公升清水)搾奶時使用上述稀釋液消毒清洗乳房用水。擦洗乳房用器材，紙巾較布質者為佳。 3.手的消毒：(75ml本溶液加4公升清水)搾奶前搾乳工人應用上述稀釋溶液做手部浸浴消毒，最好能戴上橡皮手套。	適應症 在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及榨乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。 用法用量 1.本品為一現成的乳頭浸浴溶液，不需稀釋，即可做為乳頭浸浴或噴霧。 2.乳房清洗：(75ml本溶液加4公升清水)搾奶時使用上述稀釋液消毒清洗乳房用水。擦洗乳房用器材，紙巾較布質者為佳。 3.手的消毒：(75ml本溶液加4公升清水)搾奶前搾乳工人應用上述稀釋溶液做手部浸浴消毒，最好能戴上橡皮手套。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝
Nutritional supplement

產品		
製品編號	E611727	E081625
品名	血能補－100注射液 ® Inoplex-100 ® Injection 100mL/10vial	美極命－G注射液 ® Methimin-G ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Iron dextran complex eq. to Iron....100mg	Each 100mL contains： DL-Methionine N.F. ……2.5gm Thiamine Hydrochloride(B1) U.S.P ……25mg Riboflavin(B2) J.P. .....10mg Dextrose U.S.P ……10gm
說明	適應症 預防及治療仔豬缺鐵性貧血症。 用法用量 預防：仔豬出生2~5天內，後腿肌肉深部注射1mL。 治療：通常於出現缺鐵症狀時，後腿肌肉深部注射1mL，若症狀未見改善時，再補充1mL。症狀嚴重時，後腿肌肉深部注射2mL。	適應症 維持肝臟正常功能、解毒、食慾不振、消除疲勞、酸中毒、腹水、浮腫。 用法用量 牛、馬(大)：100~250mL 牛、馬(中)：50~100mL 牛、馬(小)：30~50mL 豬、羊、犬(大)：20~30mL 豬、羊、犬(中)：10~20mL 豬、羊、犬(小)：3~10mL 或按體重每公斤0.6mL，每日一次，行靜脈或肌肉注射；必要時視症狀增加劑量及次數並連續使用。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝

Nutritional supplement

產品		
製品編號	E101398	E052403
品名	維畜鈣注射液 ® Polycalcium ® Injection 100mL/10vial	保畜維他注射液 ® Polyvita ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Calcium Gluconate....500 mg	每mL含： Vit.B1...1.12mg,Vit.B2...0.10mg Vit.B6...0.10mg,Vit.B12...0.30ug Niacin...2.00mg,DL-Met....10mg Ca.Panto....2.00mg,Inositol...1.00mg Choline...1.00mg,Dextrose...50.00mg Caffeine and Sod.Benzoate...30.00mg
說明	適應症 低血鈣、乳熱、四肢搐弱、缺鈣麻痺、產乳麻痺。過敏性、中毒性及神經性疾患鈣代謝障礙、佝僂症、骨質軟化症、酮尿症、新生動物機能萎縮。一般代謝障礙、分娩無力。農藥、四氯化碳、鉛、氟、氰、草酸、酒石酸、有機氯、殺蟲劑及其它化學藥品中毒，或肝損傷之預防及輔助治療。 用法用量 牛、馬(500kg↑)：90~125mL，牛、馬(100~500kg)：30~90mL，犢牛、小馬：20~30mL，羊：20~30mL，視症狀增減劑量，行皮下、肌肉或靜脈注射。豬：20~30mL，皮下注射。仔豬：2~3mL，皮下注射。犬：2~4mL，肌肉或靜脈注射。貓：0.5~3mL，肌肉注射。	適應症 消除疲勞、產前產後營養補給、增強肝臟機能、強心、解毒及身體組織賦活。 用法用量 大動物：50~100mL。 中動物：20~50mL。 每日1~2次肌肉或皮下注射。
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝
Nutritional supplement

產品		
製品編號	E091547	N131125
品名	複方維他命B注射液 ® Vitalex ® Injection 100mL/10vial	賜滅痢注射液 ® Smelin ® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains： Thiamine Hydrochloride....100 mg Riboflavin....5 mg Pyridoxine Hydrochloride....5 mg Niacinamide....50 mg D-Panthenol....5 mg	Each mL contains： Benzetimide hydrochloride equivalent to Benzetimide....0.15mg
說明	適應症 口內炎、神經炎、營養失調、貧血、疲勞、營養補給，及維他命B1、B2及B6缺乏諸症。 用法用量 小豬(40公斤以下)：1~2 mL。 中豬(40~75公斤)：2~3 mL。 大豬(75公斤以上)：3~5 mL。 牛馬：1~10 mL。 幼牛馬、綿羊、山羊：1~5 mL。 貓、狗、兔：1~2 mL。 行皮下、肌肉或靜脈注射。	適應症 牛、羊、豬、狗下痢症狀之治療。 用法用量 牛、羊：每10公斤體重肌肉注射1mL最高投予量為20mL。 豬、狗：每2.5公斤體重肌肉注射1mL。 如有必要時，可每隔24小時後，重複注射Benzetimide治療。
處方藥別	第二類	第二類

產品	
製品編號	N091924
品名	通血能200注射劑 ® Tonkey 200 ® Injection 100mL/5vial
成份	Each mL contains: Iron Dextran eq. to Iron 200mg
說明	適應症 豬：仔豬的缺鐵性貧血。 用法用量 腿深部肌肉注射鐵的劑量如下： 豬：每頭仔豬以100至200毫克的劑量，給予一次或每隔幾日給予。 劑量可以根據症狀適當的增減調整。
處方藥別	第二類

產品	
製品編號	E611947
品名	催產素注射劑 ® Oxytocin ® Injection 10mL/12vial
成份	Each mL contains： Oxytocin Synthetic....10Units
說明	適應症 刺激子宮、增強分娩時子宮之收縮力，預防產後出血及產後子宮鬆弛；治療分娩時子宮收縮無力、子宮出血及產後子宮收縮不全。 用法用量 牛、馬：5~10 mL。 豬、羊：3~5mL。 犬、貓：0.1~1.5mL。 ※使用本劑時，應在母畜子宮頸已擴張後才能注射，否則易導致子宮破裂。施行肌肉或皮下注射。
處方藥別	第一類

產品	
製品編號	N161238
品名	畜舒坦 ® Stroless ® Injection 100mL/5vial
成份	Each mL contains： Azaperone....40mg
說明	適應症 專用於控制豬精神安定方面：包括豬的狂燥、興奮時鎮靜、移動、運輸或併欄時爭鬥防止及情緒緩和。 ※ 肌肉注射時應使用消毒過之長注射針在耳根後垂直注射或深入後腿，以避免因用法不正確或用量不足而導致效果不良。 用法用量 攻擊性母豬：1mL/20kg，I.M. 緊迫之預防及緩解：0.5~1mL/20kg，I.M. 公豬載運：0.5mL/20kg，I.M 急性心衰竭： 1mL/100kg，I.M. ※停藥期：7天。
處方藥別	第一類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	E001524	E001672
品名	安蒙西林20% ® Amoxicillin W.S.P 20% ® W.S.Powder 20kg/Bag	安蒙西林20% ® Amoxicillin W.S.P 20% ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)
說明	適應症 雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。 ※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。	適應症 雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。 ※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000065	E001380
品名	安蒙西林50% ® Amoxicillin W.S.P 50% ® W.S.Powder 20kg/Bag	安蒙西林50% ® Amoxicillin W.S.P 50% ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)
說明	適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。	適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	P610569	P611285
品名	賜福素散 ® Cephalin ® W.S.Powder 20kg/Bag	賜福素散 ® Cephalin ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains： Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)	Each gm contains： Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)
說明	適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。 用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：2天。	適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。 用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：2天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000656	E001005
品名	可立使淨－110 ® Colistin-110 ® Powder 20kg/Bag	林可黴素－110 ® Lincomycin-110 ® Powder 20kg/Bag
成份	Each gm contains： Colistin sulfate.....110mg(potency)	Each kg contains： Lincomycin HCL....110 gm (potency)
說明	適應症 治療牛、豬，對本劑具有感受性細菌(沙氏桿菌，大腸桿菌)引起之下痢。 用法用量 牛：依每日每公斤體重經口投予本劑18~45mg。 豬：依每日每公斤體重經口投予本劑36~90mg。 ※停藥期：3天。	適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。 用法用量 每噸飼料添加本品0.4~1kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000041	E001665
品名	林可黴素－220 ® Lincomycin-220 ® Powder 20kg/Bag	林可黴素 40% ® Lincomycin 40% ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains： Lincomycin HCL....220 gm (potency)	Each kg contains： Lincomycin HCL....400 gm (potency)
說明	適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。 用法用量 每噸飼料添加本品0.2~0.5kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天。	適應症 豬：治療赤痢 肉雞：治療壞死性腸炎 用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當於250 mg的Lincomycin，連續最多投予10天。 雞：每公升飲水添加相當於16.9 mg的Lincomycin，連續使用7天。 ※ 停藥期：豬：1天，雞：2天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000429	N000405
品名	可賜興－220 ® Cotusin-220 ® Powder 20kg/Bag	可賜興－666 ® Cotusin-666 ® W.S.Powder 750gm/Tin
成份	Each kg contains： Lincomycin HCL....110gm(potency) Spectinomycin sulfate....110gm(potency)	Each 150g contains： Lincomycin HCL....33.3gm(potency) Spectinomycin HCL....66.7gm(potency)
說明	適應症 治療豬赤痢、細菌性腸炎、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 用法用量 每噸飼料添加本品0.2~0.5 kg ，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：1天。 注意事項： 1.本劑不可與紅黴素同時使用。 2.豬使用本劑可能會發生軟便、下痢或肛門腫脹。 3.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用 。	適應症 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 用法用量 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 ※停藥期：8天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000883	N171552
品名	多欣－200 ® Doxin-200 ® W.S.Powder 1kg/Bag	肥力王－VN ® Feradox-VN ® W.S.Powder 460gm/Bag
成份	Each gm contains： Doxycycline Hyclate....200 mg (potency)	每公斤含有： Neomycin Sulfate...11.628g Vit.A...1,395,349I.U.，Vit.D3...465,116I.U. Vit.K...1.163g，Vit.E...744 I.U.，Vit.B1...0.465g Vit.B2...1.395g，Vit.B12...6.977mg，Vit.B5...9.302g Fe...15.4 g，Cu...0.465g
說明	適應症 治療家禽CRD及併發症如：可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎及大腸桿菌感染症。 用法用量 添加於飲水中，劑量為50ppm，即1噸水中添加本劑250公克。 ※停藥期：3天。	適應症 治療仔豬細菌性腸炎及貧血。 用法用量 豬： 1.每天每窩(10隻)20日齡內仔豬使用量：每1公升飲水添加23公克口服投予。 2.每天每窩(10隻)20日齡以上仔豬使用量：每2公升飲水添加23公克口服投予。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000151	N000711
品名	獲利欣 1% ® Floricin 1% ® Powder 20kg/Bag	獲利欣10% ® Floricin 10% ® Powder 10kg/Bag
成份	Each kg contains： Florfenicol....10 gm	Each kg contains: Florfenicol….100 gm
說明	適應症 豬: 治療放線桿菌胸膜肺炎、巴氏桿菌肺炎、沙氏桿菌症、大腸桿菌及其他對本劑具有感受性之細菌所引起之感染。 土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 治療水禽雷氏桿菌之感染症。 用法用量 豬: 每噸飼料添加本劑2~4公斤，或每公斤體重投與本劑0.1~0.2公克(相當於Florfenicol 1~2毫克)。 土番鴨：每公斤體重投與本品40毫克，每天一次，連續使用5天。 ※停藥期：豬：3天，土番鴨：14天。	適應症 豬: 治療放線桿菌胸膜肺炎、巴氏桿菌肺炎、沙氏桿菌症、大腸桿菌及其他對本劑具有感受性之細菌所引起之感染。 土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 治療水禽雷氏桿菌之感染症。 用法用量 豬: 每噸飼料添加本劑0.2~0.4公斤，或每公斤體重投與本劑0.01~0.02公克(相當於Florfenicol 1~2毫克)。 土番鴨：每公斤體重投與本品0.4公克(相當於Florfenicol 40毫克)，每天一次，連續使用5天。 ※停藥期：豬：3天，土番鴨：14天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000577	N000216
品名	羥四環素－220 ® Oxytetracycline-220 ® Powder 25kg/Bag	羥四環素－500 ® Oxytetracycline-500 ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains： Oxytetracycline Base....220 gm (potency)	Each gm contains： Oxytetracycline HCL....500 mg (potency)
說明	適應症 雞、火雞、鴨(不含產蛋中之蛋禽):治療包括大腸桿菌敗血症、家禽霍亂、雛白痢、鴨敗血症、臍炎、傳染性鼻炎及慢性呼吸器病。豬:治療呼吸道及腸道細菌性下痢，如萎縮性鼻炎、黴漿菌肺炎、放線桿菌胸膜肺炎(APP)、細菌性腸炎、增殖性腸病極大腸桿菌、沙氏桿菌感染症。犢羊、犢牛:治療呼吸道、敗血症及腸道感染，包括由沙氏桿菌和巴氏桿菌引起的感染。 用法用量 雞、火雞、鴨(不含產蛋中之蛋禽):每公噸飼料添加0.5~0.9公斤。豬:每公噸飼料添加0.5~0.9公斤。犢羊、犢牛:每公噸飼料添加2.7公斤。 ※ 停藥期：5天。	適應症 治療豬具敏感性細菌感染所引起的腸炎及肺炎；治療雞具敏感性細菌感染所引起的慢性呼吸器病、傳染性可利查及下痢。 用法用量 豬：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：3天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000443	E001586
品名	泰康欣－200 ® Tiacosin-200 ® Powder 10kg/Bag	泰康欣 250 ® Tiacosin 250 ® Solution 480 mL/Btl
成份	Each kg contains: Tilmicosin phosphate....200 gm (potency)	Each mL contains： Tilmicosin phosphate eq. to Tilmicosin 250mg (potency)
說明	適應症 控制由放線桿菌(Actinobacillus Pleuropneumoiae)，黴漿菌(Mycoplasma Hyopneumoniae)，巴斯德桿菌(Pasteurella Multocida)或其它對Tilmicosin敏感的微生物所引起的肺炎。 用法用量 治療肥育期豬隻肺炎： 2kg/每噸飼料，連續餵食14天。 ※ 停藥期：14天。	適應症 豬：對因Mycoplasma hyopneumoniae、Pasteurella multocida、Actinobacillus pleuropneumoniae、Actinomyces pyogenes所引起的豬呼吸道疾病之治療。 雞(不含產蛋中之蛋雞)：對因Mycoplasma gallisepticum以及M. synoviae所引起的雞呼吸道疾病之治療。 用法用量 豬：100公升的飲水中加入81毫升的泰康欣濃縮液，且連續使用5天。雞(不含產蛋中之蛋雞)：100公升的飲水中加入30毫升的泰康欣濃縮液，且連續使用3天。藥用飲水應每24小時更新，以確保新鮮。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：豬：14天。雞：12天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑
Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000742	N170850
品名	泰樂新AT-50散劑 ® Tylosin AT-50 ® Powder 10kg/Bag	泰利美寧 ® Trimerin ® Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains： Acetylisovaleryltylosin tartrate.....50mg(potency)	Each gm contains： Sulfadimethoxine....400 mg Trimethoprim....80 mg
說明	適應症 治療豬地方性肺炎、鏃漿菌性關節炎、鼻炎。 治療雞(不含蛋雞)慢性呼吸器病、鏃漿菌、葡萄球菌及鏈球菌感染症。 用法用量 每噸飼料添加0.4~1公斤，視病情連續使用5~7天。 ※停藥期：豬：3天，雞：5天。	適應症 豬：各種細菌性下痢、黃白痢、MMA綜合症、細菌性肺炎、關節炎、鼻炎。 雞：細菌性下痢、白痢、傳染性可利查、家禽霍亂、大腸桿菌症。 用法用量 控制： 每噸飼料添加本品250gm 治療： 每噸飼料添加本品400gm ※ 停藥期：15天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

含藥物飼料添加劑

Medicated feed additives

產品		
製品編號	N000498	P611199
品名	泰妙素 20% ® Tiamulin 20% ® Powder 1kg/Bag	泰妙素 20% ® Tiamulin 20% ® Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains： Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)	Each kg contains： Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)
說明	適應症 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 用法用量 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。	適應症 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 用法用量 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。
處方藥別	第三類	第三類

產品	
製品編號	E003007
品名	泰黴素－220 ® Tylosin-220 ® Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains： Tylosin phosphate....220 gm (potency)
說明	適應症 雞：促進生長及改進飼料利用效率 產蛋雞：改進飼料利用效率 豬：1.可預防豬赤痢，2.促進生長及改進飼料利用效率 用法用量 雞：每噸飼料添加20~250公克。 產蛋雞：每噸飼料添加100~250公克。 豬：1.預防豬赤痢：每噸飼料添加454~500公克連續餵飼3週後，改用200公克至出售。2.促進生長及改進飼料利用效率：(1)體重60kg以上的豬：每噸飼料添加50~100公克，(2)體重30~60kg的豬：每噸飼料添加100~200公克，(3)體重10~30kg的豬：每噸飼料添加100~500公克。
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑
Other preparations

產品		
製品編號	N000113	N000319
品名	克嗽靈 ® Cousorin ® Powder 1kg/Bag	克嗽靈 ® Cousorin ® Powder 20kg/Bag
成份	Each gm contains： Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains： Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	適應症 豬、雞: 治療因支氣管炎、咽喉炎、急慢性呼吸諸患疾所引起之咳嗽、氣喘等症狀。豬、雞因感染黴漿菌、嗜血桿菌、巴斯德桿菌、放線桿菌、藍耳病病毒、流行性感冒病毒等引起的呼吸道綜合症狀，如咳嗽、發燒、呼吸困難、氣管分泌液過多、黏膜水腫、喀痰、鼻塞、流鼻水、失溫（畏寒）等臨床症狀。本劑含有5種主要成分可以止咳、祛痰及緩解感冒症狀，使病程縮短，降低死亡率。 用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。	適應症 豬、雞: 治療因支氣管炎、咽喉炎、急慢性呼吸諸患疾所引起之咳嗽、氣喘等症狀。豬、雞因感染黴漿菌、嗜血桿菌、巴斯德桿菌、放線桿菌、藍耳病病毒、流行性感冒病毒等引起的呼吸道綜合症狀，如咳嗽、發燒、呼吸困難、氣管分泌液過多、黏膜水腫、喀痰、鼻塞、流鼻水、失溫（畏寒）等臨床症狀。本劑含有5種主要成分可以止咳、祛痰及緩解感冒症狀，使病程縮短，降低死亡率。 用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品
Drugs for Pigs and Cattle

產品		
製品編號	P611450	E451509
品名	長生精精液稀釋劑 ® Semengra Semen Extender ® Powder 25gm*2Bag	速保精Ⅱ精液稀釋液 ® Sperm-up Ⅱ ® Solution 500mL/20Btl
成份		
說明	適應症 公豬精液稀釋及延長精液保存時間。 用法用量 請詳閱說明書。	適應症 公豬精液稀釋及延長精液保存時間。 用法用量 請詳閱說明書。
處方藥別		

產品	
製品編號	N001729
品名	舒爾利軟膏劑 ® Surefit ® Ointment 5.0gm/4's
成份	Each gm contains： Miconazole Nitrate....20mg Polymyxin B sulfate....5,000 U(potency) Bacitracin....250 U(potency)
說明	適應症 1.Miconazole 是一種合成的imidazole 的衍生物，具有卓越的抗黴菌效果。 2.Polymyxin B 是一種具有殺革蘭氏陰性菌作用的抗生素。 3.Bacitracin 是一種具有殺革蘭氏陽性菌作用的抗生素。 適應症：犬、貓、鴿子：治療結膜炎、角膜炎及手術後的預防感染。 用法用量 每天2 次，每次將適量軟膏塗於感染的眼睛內，治療中不可中斷，直到臨床症狀消失後幾天為止。
處方藥別	第三類

產品	
製品編號	E050494
品名	富樂－B液 ® Hope-B Drops ® Drops 30mL/Btl
成份	每mL含： Vit.A...1,000IU，Vit.D2...100IU，Vit.B1...1mg Vit.B2...0.25mg，Vit.B6...0.25mg，Niacin.....2.5mg D-Panthenol...1mg，Vit.C...l0mg Vit.B12...0.25mcg，Biotin(H)...5mcg L-Lysine...15mg，DL-Threonine...7.5mg
說明	適應症 促進發育、增進食慾、增加體重、疾病感染抵抗力之增強、體力賦活、體質強化、蛋白質代謝改善、營養補給等。 用法用量 幼犬。每次0.5~1mL，一日三次。必要時可增加用量。 貯藏法：室溫：遮光貯存。
處方藥別	

伴侶動物用藥品
Pet Drugs

外用液劑
External solution

產品		
製品編號	N001743	N001750
品名	滴爾易懸液劑 ® Earzi ® Suspension 15mL/Btl	滴爾易懸液劑 ® Earzi ® Suspension 500mL/Btl
成份	Each mL contains： Miconazole Nitrate.....23mg Prednisolone Acetate.....5mg Polymyxin B Sulfate.....5500I.U.	Each mL contains： Miconazole Nitrate.....23mg Prednisolone Acetate.....5mg Polymyxin B Sulfate.....5500I.U.
說明	適應症 貓、狗：治療因黴菌、酵母菌、革蘭氏陰、陽性細菌引起之耳炎、皮膚感染。 用法用量 耳：耳道洗淨，一天二次滴本劑數滴入耳，再按摩之，使之完全吸收。 皮膚：依傷口大小滴數滴，一天二次。 治療直到症狀完全消失數天為止，頑固症狀有時須2~3週。 注意事項： 1使用前搖均勻。 2治療開始前將傷口附近毛髮剃除。 3本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。	適應症 貓、狗：治療因黴菌、酵母菌、革蘭氏陰、陽性細菌引起之耳炎、皮膚感染。 用法用量 耳：耳道洗淨，一天二次滴本劑數滴入耳，再按摩之，使之完全吸收。 皮膚：依傷口大小滴數滴，一天二次。 治療直到症狀完全消失數天為止，頑固症狀有時須2~3週。 注意事項： 1使用前搖均勻。 2治療開始前將傷口附近毛髮剃除。 3本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。
處方藥別	第三類	第三類

伴侶動物用藥品
Pet Drugs

外用液劑
External solution

產品		
製品編號	N411463	E432074
品名	輕鬆洗 外用液劑 ® Easywash ® External solution 250mL/Btl	芝波洗髮精20公絲 ® Ketoconazole 2% ® Shampoo 3.8L
成份	Each L contains： Chlorhexidine gluconate…..20gm Miconazole nitrate…..20gm	Each gm contains： Ketoconazole....20mg
說明	適應症 幫助治療伴隨葡萄球菌和犬皮屑芽孢菌感染之犬貓皮脂漏皮膚炎、犬小芽孢菌、様小芽孢菌和髮癬菌引起的皮癬菌感染(特別是錢癬)，縮短其臨床症狀的時間及殺死具傳染性的孢子。 用法用量 用清水將動物皮毛徹底打溼，將『輕鬆洗』塗拭於身體多處並加以按摩，投藥十分鐘後再以清水洗淨。每週重覆二次直到症狀緩解，之後每週使用一次。	適應症 減少因黴菌感染所引起之頭皮屑治療之輔助劑。 用法用量 醫師藥師藥劑生指示藥品。 1.治療：(1)脂漏性皮膚炎及頭皮屑：每週二次，連續四週。(2)汗斑：每天一次，連續五天。 2.預防：(1)脂漏性皮膚炎及頭皮屑：每週或每二週一次。(2)汗斑：夏季來臨前，每天一次，連續三天。 〔用法〕先用清水沖過後，取本品用量約為掌心大小，搓揉按摩頭部約3~ 5分鐘，增加效用，再用清水沖淨即可，應避免再用潤絲精以利效用。
處方藥別	第三類	第三類

產品	
製品編號	N451065/N450930
品名	舒聰敏 ® Suroclean ® Drops 120mL/12Btl/24Btl
成份	Tris-EDTA(丁三醇 – 乙二胺四乙酸)、PCMX(氯二甲苯酚)、Salicylic Acid(水楊酸)、Docusate sodium (多庫脂鈉)、Propylene glycol(丙二醇)、芳香劑、純水
說明	用法用量 1. 清洗及清潔耳道與外耳 2. 旋轉塑膠瓶蓋將瓶子打開 3. 將瓶子頂端置入耳內並擠壓瓶身將舒露清™潔耳液擠入耳道內直到完全填滿為止 4. 溫柔地按摩外耳道基部數秒鐘以使潔耳液達到耳道底部 5. 任其停留並作用幾分鐘 6. 允許寵物甩掉多餘的潔耳液 7. 清潔外耳並擦去過剩的潔耳液 本產品不可使用於耳鼓膜破裂之患畜，如果無法確定時請尋求您的獸醫師的建議。
處方藥別	

產品		
製品編號	N161104	N161111
品名	力停疼25毫克 ® Painoff Caplets 25mg ® Tablet 60 Tab/Btl	力停疼75毫克 ® Painoff Caplets 75mg ® Tablet 60 Tab/Btl
成份	Each tablet contains： Carprofen...25mg	Each tablet contains： Carprofen...75mg
說明	適應症 犬:減輕犬隻的疼痛及發炎情況，並舒緩犬骨關節炎引起之相關症狀的臨床效果。 用法用量 犬隻口服的推薦劑量每日每公斤體重4.4mg的Carprofen，可一次投予4.4mg/公斤體重或每公斤體重2.2mg的Carprofen，每日兩次。 僅供犬隻使用，勿使用於貓隻。	適應症 犬:減輕犬隻的疼痛及發炎情況，並舒緩犬骨關節炎引起之相關症狀的臨床效果。 用法用量 犬隻口服的推薦劑量每日每公斤體重4.4mg的Carprofen，可一次投予4.4mg/公斤體重或每公斤體重2.2mg的Carprofen，每日兩次。 僅供犬隻使用，勿使用於貓隻。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

抗菌劑
Antimicrobial agent

產品		
製品編號	N170850	E041418
品名	泰利美寧 ® Trimerin ® Powder 1kg/Bag	泰利美寧48% ® Trimerin 48% ® Solution 500mL/Btl
成份	Each gm contains： Sulfadimethoxine....400 mg Trimethoprim....80 mg	Each mL contains： Sulfadiazine....400mg Trimethoprim....80mg
說明	適應症 豬：各種細菌性下痢、黃白痢、MMA綜合症、細菌性肺炎、關節炎、鼻炎。 雞：細菌性下痢、白痢、傳染性可利查、家禽霍亂、大腸桿菌症。 用法用量 控制： 每噸飼料添加本品250gm 治療： 每噸飼料添加本品400gm ※ 停藥期：15天。	適應症 治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、巴斯德桿菌症或傳染性可利查 用法用量 雞：在500公升飲水中加入本劑200mL。 豬：在400公升飲水中加入本劑200mL。 連續使用5天或至症狀消失2天後，勿超過14天。 ※停藥期：5天。
處方藥別	第三類	第三類

產品		
製品編號	N151330	N151323
品名	唬滅諾 5% ® Flumeizole 5% ® Powder 600gm/Bag	唬滅諾 5% ® Flumeizole 5% ® Powder 25kg/Bag
成份	Each kg contains： Flubendazole....50gm(potency)	Each kg contains： Flubendazole....50gm(potency)
說明	適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 用法用量 豬：1.個別驅蟲：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲： 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1.驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2.驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。	適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 用法用量 豬：1.個別驅蟲：5mg(1gm/10kg體重)一次給予。2.集體驅蟲： 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3.預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1.驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2.驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3.驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。
處方藥別	第三類	第三類

產品		
製品編號	N151000	N201185
品名	樂蟲滅散 ® Lepicom ® Powder 1kg/Bag	特球除2.5% ® Toltracox 2.5% ® Oral Sol. 1000mL/Btl
成份	Each gm contains： Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....100mg	Each mL contains: Toltrazuril.....25mg
說明	適應症 豬：蛔蟲及其移行性幼蟲，肺蟲、鞭蟲、腸類圓蟲(淡紅豬圓蟲及結節線圓蟲屬)、類腸圓蟲(藍森桿蟲)。 牛、羊：肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、結節線圓蟲、枯貝氏蟲、線蟲。 家禽：蛔蟲、雞盲腸蟲、毛細線蟲。 用法用量 豬：依下列用量溶於飲水中，體重100公斤以下，每20公斤體重給予1公克，體重100公斤以上，每頭給予5公克。 牛：每200公斤體重給予10公克溶於水中灌服。 家禽：每公斤體重給0.2~0.25公克溶於飲水中。 ※停藥期: 7天，乳品: 72小時。	適應症 控制或治療種禽球蟲病如E. acervulina, maxima, brunetti, mivati, necatrix, tenella。 用法用量 根據動物日齡及飼養環境，每公升飲水添加1mL本品，連用兩天；或每公升飲水添加3mL本品，每天8小時，連用兩天。 本品標準添加量為每公斤活體重使用7mg的Toltrazuril連續兩天。 ※停藥期：8天
處方藥別	第三類	

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑
Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	E001524	E000963
品名	安蒙西林20% ® Amoxicillin W.S.P 20% ® W.S.Powder 20kg/Bag	安蒙西林20% ® Amoxicillin W.S.P 20% ® W.S.Powder 500g*2/Bag
成份	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)
說明	適應症 雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。 ※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。	適應症 雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。 ※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑
Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N000065	E001380
品名	安蒙西林50% ® Amoxicillin W.S.P 50% ® W.S.Powder 20kg/Bag	安蒙西林50% ® Amoxicillin W.S.P 50% ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)	Each kg contains： Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)
說明	適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。	適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。 用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。
處方藥別	第三類	第三類

產品		
製品編號	P610569	P611285
品名	賜福素散 ® Cephalin ® Powder 20kg/Bag	賜福素散 ® Cephalin ® Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains： Cephalexin Monohydrate....150 mg (potency)	Each gm contains： Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)
說明	適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。 用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：2天。	適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。 用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：2天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑
Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N001097	E001665
品名	可立使淨－120 ® Colistin-120 ® Powder 500gm/Bag	林可黴素 40% ® Lincomycin 40% ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains： Colistin sulfate.....120 mg(potency)	Each kg contains： Lincomycin HCL....400gm(potency)
說明	適應症 豬、小牛(3個月齡以下)、家禽(肉雞、火雞及產蛋雞)：治療對Colistin敏感之大腸桿菌或沙門氏菌所引起之消化道感染。(如有敗血症發生則需有相對應的附加治療) 用法用量 將本劑溶於飲水中，立即給予，連續治療5~7天。 豬：每日每公斤體重給予本劑42~50mg。 小牛：每日每公斤體重給予本劑42~50mg。 家禽(肉雞、火雞及產蛋雞)：每日每公斤體重給予本劑50mg。 ※停藥期：3天。	適應症 豬：治療赤痢 雞：治療壞死性腸炎 用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當於250 mg的Lincomycin，連續最多投予10天。 雞：每公升飲水添加相當於16.9 mg的Lincomycin，連續使用7天。 ※ 停藥期：豬：1天，雞：2天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N000405	N000890
品名	可賜興－666 ® Cotusin-666 ® W.S.Powder 750gm/Tin	多欣－200 ® Doxin-200 ® W.S.Powder 500g*2/Bag
成份	Each 150g contains： Lincomycin HCL....33.3gm Spectinomycin HCL....66.7gm	Each gm contains： Doxycycline Hyclate....200mg (potency)
說明	適應症 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 用法用量 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 ※停藥期：8天	適應症 治療家禽CRD及併發症如：可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎及大腸桿菌感染症。 用法用量 添加於飲水中，劑量為50ppm，即1噸水中添加本劑250公克。 ※停藥期：3天
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑
Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	E000633	E001706
品名	雅黴素飲水劑 ® Erymycin WSP 500 ® W.S.Powder 1kg/Tin	獲利欣10% ® Floricin 10% ® Solution 500mL/1000mL
成份	Each gm contains： Erythromycin Thiocyanate....500mg(potency)	Each mL contains： Florfenicol....100mg
說明	適應症 治療雞隻呼吸器病(CRD)、傳染性可利查。 用法用量 1.一般治療：每公噸飲水添加本劑200公克使用5天或依獸醫指示使用。 2.緊迫治療：每公噸飲水添加本劑200公克，最好在緊迫前二天即開始使用，繼續服用三天，在緊迫期間維生素及礦物質亦須添加。 ※停藥期：7天	適應症 治療豬放線桿菌胸膜肺炎及雞大腸桿菌症。 用法用量 豬:每日每公斤體重投與本品0.01mL~0.02mL相當於Florfenicol 1~2 mg(即本品0.01mL~0.02mL)之量，加入飲水混合後經口投與。雞每日飲水的1/4至1/2中，以每公斤體重投與本品0.2mL(相當於Florfenicol 20mg)，加入飲水混合後經口投與，連續使用五天。 ※停藥期：豬：3天，雞：5天，土番鴨：14天，雞16週齡以上，產蛋中之蛋雞不得使用。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑
Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	E001586	E140487
品名	泰康欣 250 ® Tiacosin 250 ® Solution 480mL/Btl	富鯁口服液20% ® Furich Sol. 20% ® Solution 1L/Btl
成份	Each mL contains： Tilmicosin phosphate eq. to Tilmicosin....250mg(potency)	Each mL contains： Flumequine....200mg
說明	適應症 豬：對因Mycoplasma hyopneumoniae,Pasteurella multocida,Actinobacillus pleuropneumoniae,Actinomyces pyogenes 以及其它對tilmicosin具感受性的微生物病源體所引起的豬呼吸道疾病之防治。 雞：對因Mycoplasma gallisepticum以及M.synoviae 所引起的雞呼吸道疾病之防治。 用法用量 豬：100公升的飲水中加入81毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有200毫克的tilmicosin，且連續使用5天。 . 雞：100公升的飲水中加入30毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有75毫克的tilmicosin，且連續使用3天。 ※停藥期：12天	適應症 治療家禽之大腸桿菌症、沙門氏桿菌症、巴斯德桿菌症、傳染性可利查及葡萄球菌症等所引起之腸胃道和呼吸道感染症。 用法用量 1.家禽：每200公升飲水中添加100mL，溶解均勻即可。 2.每日每公斤體重服用12mg Flumequine ※ 停藥期：7天
處方藥別	第三類	第三類

產品	
製品編號	N000780
品名	泰樂新水溶性散 ® Tylosin WSP ® W.S.Powder 750g/Bag
成份	Each gm contains： Tylosin Tartrate....0.667gm(potency)
說明	適應症 治療因Mycoplasma synoviae菌所引起之雞隻氣囊炎，及因Mycoplasma gallsepticum S6菌所引起之雞或火雞之慢性呼吸器病。 用法用量 將150gm之泰樂新水溶性散劑溶入200公升水中，作為家禽唯一飲水來源，連續飲用2~5天。 ※停藥期：肉雞3天。
處方藥別	第三類

家禽用藥品
Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑
Medicated feed additives

產品		
製品編號	N000498	P611199
品名	泰妙素 20% ® Tiamulin 20% ® Powder 1kg/Bag	泰妙素 20% ® Tiamulin 20% ® Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains： Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)	Each kg contains： Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency) (採用coating原料)
說明	適應症 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 用法用量 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。	適應症 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 用法用量 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。
處方藥別	第三類	第三類

產品		
製品編號	N000113	N000319
品名	克嗽靈 ® Cousorin ® Powder 1kg/Bag	克嗽靈 ® Cousorin ® Powder 20kg/Bag
成份	Each g contains： Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains： Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL ....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	適應症 豬、雞: 治療因支氣管炎、咽喉炎、急慢性呼吸諸患疾所引起之咳嗽、氣喘等症狀。豬、雞因感染黴漿菌、嗜血桿菌、巴斯德桿菌、放線桿菌、藍耳病病毒、流行性感冒病毒等引起的呼吸道綜合症狀，如咳嗽、發燒、呼吸困難、氣管分泌液過多、黏膜水腫、喀痰、鼻塞、流鼻水、失溫（畏寒）等臨床症狀。本劑含有5種主要成分可以止咳、祛痰及緩解感冒症狀，使病程縮短，降低死亡率。 用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。	適應症 豬、雞: 治療因支氣管炎、咽喉炎、急慢性呼吸諸患疾所引起之咳嗽、氣喘等症狀。豬、雞因感染黴漿菌、嗜血桿菌、巴斯德桿菌、放線桿菌、藍耳病病毒、流行性感冒病毒等引起的呼吸道綜合症狀，如咳嗽、發燒、呼吸困難、氣管分泌液過多、黏膜水腫、喀痰、鼻塞、流鼻水、失溫（畏寒）等臨床症狀。本劑含有5種主要成分可以止咳、祛痰及緩解感冒症狀，使病程縮短，降低死亡率。 用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。
處方藥別	第三類	第三類

營養保健
Nutritional supplement

維生素補助飼料
Vitamin supplement feed additives

產品		
製品編號	E170765	P611845
品名	益肥王 ® Ephepan ® W.S.Powder 1kg/Bag	興畜綜合維生素 ® SYT-SV ® Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains： Vit.A....10,000,000I.U.，Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....1,500I.U.，Vit.B1....5gm，Vit.B2....5gm Vit.B6....1gm，Vit.B12....5.5mg，Vit.C....10gm Vit.K3....1.5gm，Panto.....8gm，Niacin....10gm	各種綜合脂溶性與水溶性維生素
說明	用法用量 魚類：撒本品1,000gm~1,500gm於1公噸的水池中 家禽類：溶解本品0.5~1.0gm於1公升之飲水中 家畜類：溶解本品1.0gm於1公升之飲水中	用法用量 種豬：每噸飼料添加0.6kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

礦物質補助飼料

Mineral supplement feed additives

產品	
製品編號	P612877
品名	興畜綜合礦物質 ® SYT-SM ® Powder 25kg/Bag
成份	Each kg contains： Fe....125gm，Zn....90~100gm Mn....15gm，Cu....20~23gm I....1gm，Se....0.3gm Co....0.3gm
說明	用法用量 種豬：每噸飼料添加0.7kg 仔豬：每噸飼料添加0.8kg 肉豬：每噸飼料添加0.5kg
處方藥別	

營養保健
Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料
Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	N171521	E050456
品名	倍多－E120 ® Better-E120 ® Powder 20kg/Bag	泌多乳 CDC－A1 ® CDC-A1 ® Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains： Vit.E....120,000I.U.， Biotin....0.06gm Folic acid....2.0gm，Org.Fe....40.0gm Org.Zn....18.0gm，Org.Mn....8.0gm Org.Se....0.2gm，Cr3....0.4gm Bacillus coagulans....1x10E12cfu	Each kg contains： Vit.A....500,000I.U.，Vit.D3....100,000I.U. Vit.E....500I.U.，Fe....302mg，Cu....255mg Mn....456mg，Zn....1,205mg，Co....12.4mg I....38.2mg，Ca....57.5gm，P....45gm Probiotic
說明	用法用量 每噸飼料添加0.5 kg	用法用量 乳牛：每日每頭100gm，分2次，每次50gm，添加於飼料中混合均勻 乳羊：每日每頭 20gm，分2次，每次10gm，添加於飼料中混合均勻
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料
Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	E053552	E170837
品名	泌多乳 CDC－A2 ® CDC-A2 ® Powder 20kg/Bag	益肥王－M ® Ephepan-M ® Powder 20kg/Bag
成份	Each 2kg contains： Vit.A....7,000,000I.U.，Vit.D3....1,000,000I.U. Vit.E....15,000I.U.，Fe....50gm，Cu....10gm Mn....60gm，Zn....60gm，Co....0.1gm I....0.6gm，Ca....250gm，P....0.1gm Probiotic	每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素、甲硫胺酸及綜合礦物質。
說明	用法用量 乳牛:每噸飼料添加本品2kg 乳羊:每噸飼料添加本品0.4kg	用法用量 魚類：每公噸飼料添加0.5~1kg 家禽類：每公噸飼料添加1~2kg 家畜類：每公噸飼料添加1~3kg
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

綜合維生素、礦物質補助飼料
Multiple vitamin and mineral supplement

產品		
製品編號	E172602	P613328
品名	速美畜 ® SGC-A5-1 ® Powder 20kg/Bag	育康茁仔豬用濃縮預拌精料 ® Eugurt-SPC supplement ® Powder 20kg/Bag
成份	每公斤含有： 各種脂溶性與水溶性維生素及綜合礦物質。	Each 20kg contains： 綜合維生素、礦物質 L-離胺酸、DL-甲硫胺酸 天然綜合酵素、植酸酶、天然植物萃取物、精油
說明	用法用量 種豬料：每噸飼料添加1kg 教槽料：每噸飼料添加1.5kg 仔豬料：每噸飼料添加1.5kg 肉前料：每噸飼料添加1kg 肉後料：每噸飼料添加0.7~1kg	用法用量 ◎預防維生素及礦物質缺乏症。 ◎提高飼料換肉率，促進生長。 每噸仔豬飼料添加20公斤。
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

其他製劑
Other preparations

產品		
製品編號	N170805	N170252
品名	倍多保 ® Bacispore ® Powder 1kg/Bag	倍多保 ® Bacispore ® Powder 25kg/Bag
成份	Each gm contains： Bacillus subtilis.....1.0×109 CFU/g Bacillus subtilis natto.....2.0×108 CFU/g Bacillus lincheniformis.....2.0×108 CFU/g Bacillus coagulans.....2.0×108 CFU/g	Each gm contains： Bacillus subtilis.....1.0×109 CFU/g Bacillus subtilis natto.....2.0×108 CFU/g Bacillus lincheniformis.....2.0×108 CFU/g Bacillus coagulans.....2.0×108 CFU/g
說明	用法用量 小豬飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 中豬飼料：每噸飼料添加0.4~0.8公斤 大豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 母豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 牛飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 家禽飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 蝦飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 鰻魚飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 其他魚類：每噸飼料添加0.5~1.0公斤	用法用量 小豬飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 中豬飼料：每噸飼料添加0.4~0.8公斤 大豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 母豬飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 牛飼料：每噸飼料添加0.3~0.6公斤 家禽飼料：每噸飼料添加0.5~1.0公斤 蝦飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 鰻魚飼料：每噸飼料添加0.8~1.2公斤 其他魚類：每噸飼料添加0.5~1.0公斤
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

其他製劑
Other preparations

產品		
製品編號	P612509	N170032
品名	益賜寶 ® Genspore ® Powder 1000gm/Bag	得舒 ® Detoxol ® W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains： Bacillus coagulans.....1.0×109 CFU/gm	Each gm contains： Sorbitol....350mg，Mg....0.48mg Na....57.78mg，Ca....0.54mg K....4.19mg，Cl....78.94mg
說明	用法用量 泌乳牛：每噸飼料添加本品0.5公斤(初期需添加1公斤，持續3~5天)或個別投與每日每頭16公克。 犢：出生後每日每頭投與5公克，溶入代奶粉中持續投與。 種豬：每噸飼料添加本品0.3-0.6公斤。 仔豬、肉豬：每噸飼料添加本品0.3-1.0公斤。 雛雞、肉雞：每噸飼料添加本品0.5-1.0公斤。 雛雞出生後：每噸飼料添加本品1公斤，持續3~5天，以後依序5天添加一次。	適應症 1.補充體內電解質，增進營養平衡。 2.增強家禽活力與體力，防止脂肪肝、脫水、尿酸症及各種緊迫現象。 3.防止尿酸沉著所引起腎臟腫大。 用法用量 1.用於補充電解質和降低緊迫：每噸飲水添加本品1kg即為稀釋1000倍，連續飲用3~5天。 2.用於防止腎臟腫大，尿酸沉著症和脫水現象：每噸飲水添加本品2kg~5kg即為稀釋200倍~500倍，連續飲用5~7天。
處方藥別		

營養保健
Nutritional supplement

其他製劑
Other preparations

產品		
製品編號	N281781	P614051
品名	利舒坦 ® Reliever ® Solution 1L/Btl	蔘果葳60 ® Sangrovit 60 ® Powder 25kg/Bag
成份	由多種天然植物萃取物及尤加利精油、薄荷精油等組合而成。	罌粟科博洛回(Macleaya cordata)萃取物 每公斤含有 ：罌粟科博洛回萃取物 60公克
說明	適應症 1.飼養環境及氣候條件劇烈變化時。 2.疫苗防疫前後之處理。 用法用量 1.每噸飲水添加本品0.5公升~1公升。 2.可依獸醫師指示搭配治療藥物使用。	適應症 ●消炎 ●提高氨基酸利用率 ●改善屠體品質 ●提高肉豬生產性能-提高採食量,飼料效率和增重 ●提高母豬生產性能-提高窩重 ●作為抗生素生長促進劑的替代物(AGP's),全期使用零停藥期 ●通過歐盟FAMI-QS認證,能使用於有機農場 用法用量 提高飼料效率和增重:每噸飼料添加0.4~0.5公斤。 改善生產性能:每噸飼料添加0.5~1.0公斤。 緩解緊迫與病原壓力:每噸飼料添加1.0~1.5公斤。
處方藥別		

產品		
製品編號	N170276	P612145
品名	維能肝 ® Silyvita ® Powder 1kg/Bag	動物用維能肝濃縮液 ® Silyvita ® Solution 1L/Btl
成份	鳶尾科植物配醣體	鳶尾科植物抽出物
說明	適應症 強化肝功能及促進膽汁的分泌，以防止肝機能受損，改善緊迫所造成的繁殖障礙及增強免疫力。 用法用量 每噸飼料添加1公斤	適應症 強化肝功能及促進膽汁的分泌，以防止肝機能受損，改善緊迫所造成的繁殖障礙及增強免疫力。 用法用量 每噸飲水添加0.5~1公升。
處方藥別		

中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031