

號

感冒靈鼻炎錠

Allermin Tablets 4mg

網號：C20

近年來已經有多種抗組織胺劑出現，對於蕁麻疹、氣喘等各種變態反應性病徵 (Allergic Diseases) 業已廣泛使用。

成分：每錠含有：Chlorpheniramine Maleate 4mg

藥效：對組織胺及類似組織胺物質具有強力之抗衡作用，故對於因此所惹起之過敏具緩解效果。

適應症：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

用法、用量：醫師藥師藥劑生指示藥品。

一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。成人每次一錠。

12 歲以上，適用成人劑量。

6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠。

3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠。

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警語：

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有

視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。

2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議服用。
6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。

貯存：避免陽光直射，宜保存於陰涼及小孩接觸不到之處。儲存溫度：30°C 以下。

包裝：6-1000 錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號