

抗組織毒素劑

亞烈明 注射液

Allemin Injection

識別：L02

成分：每支(1ml)中含有：

Chlorpheniramine Maleate.....5mg

藥效：

對組織毒素及類似組織毒素物質具有抵抗作用，故對此等組織毒素所引起之蕁麻疹、氣喘等 Allergy 性病症具有效果。

適應症：

濕疹，蕁麻疹，神經性皮膚炎，汗疹，鼻炎，氣喘等過敏性皮膚疾病。

用法：本藥限由醫師使用。

成人每次 1~2ml，每日 1~3 次注射於皮下或肌肉內，依症狀、年齡、體質等，可適宜增減之。

注意事項：

1.一般性注意：本劑會產生欲睡，投與時從事開車或機械操作須十分小心。

2.禁忌：

◦**線內障患者。**

◦**前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患之患者。**

3.副作用：

◦**過敏症：有時會出現發疹等過敏症狀，此時請停止投與。**

◦**循環器：偶有微弱脈、站立性低血壓等症狀。**

◦**泌尿器：偶有多尿、排尿困難等症狀。**

◦**精神神經系：偶有神經過敏、頭痛、焦燥感、複視、欲睡、極少有發汗等症狀。**

◦**消化器：偶有口渴、胸悶。**

◦**血液：極少有血小板減少、粒性白血球缺乏病、再生不良性貧血等現象，因此須審慎觀察，如有異常請停止投與。**

◦**其他：極少有顏面蒼白現象。**

4.妊婦投與：

對孕婦之安全性尚未確定，孕婦或可能懷孕的婦女，判斷治療上的有益性超過危險性時，始投與。

5.相互作用：

與中樞神經抑制劑，MAO 阻害劑併用或飲酒，相互作用會增強，此時請減量、慎重投與。

6.使用上注意：

◦**注射部位會有一時性之刺激、灼熱感。**

◦**注射於肌肉或皮下時宜將注射處揉軟，以防止硬結。**

◦**本劑需遮光儲存之。**

包裝：100 支以下裝，200 支裝。

備註：本劑之主要成份 Chlorpheniramine Maleate 比以往之抗組織毒素劑具有強力之作用，因此使用微量即能發揮充分效果（如 Benadryl Hydrochloride 之 1/10~1/5 量即可）之抗組織毒素劑。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號