

臻舒喘錠 2.5 公絲

(菲諾特洛氫溴酸鹽)

Frandy Tablets 2.5mg

(Fenoterol hydrobromide)

網號：C55

本劑用來治療及預防支氣管氣喘和支氣管痙攣，可以解除各種型式的支氣管痙攣及對各種引起支氣管收縮的刺激，對於支氣管肌肉因具有快速的起始作用及很長的作用時間，故療效極佳。

成分：Each Tablet contains：

Fenoterol hydrobromide 2.5mg

適應症：

下列支氣管痙攣患者之預防與治療：

支氣管氣喘，阻塞性支氣管炎，慢性支氣管炎，氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙。

用法·用量：本藥須由醫師處方使用。

治療期間必須在醫師的觀察下，劑量可按病人的個別反應和疾病的嚴重性來增減。

一般建議劑量如下：(應該在飯前服用)

成人：每天 3 次，每次 1~2 錠。

學童(6~14 歲)：每天 3 次，每次 1 錠。

小孩(1~6 歲)：每天 3 次，每次 1/2~1 錠。

禁忌症：

甲狀腺機能亢進症，瓣膜下主動脈狹窄，心跳過快之心律不整。

藥物交互作用：

1. β -腎上腺素，抗副交感神經劑和黃鹼(Xanthine)的衍生物可能會加強本藥作用。

2. β 接受體阻斷劑具有拮抗的作用。

注意事項：

1. 只有在醫師的監護下才可以與其他擬交感神經性支氣管擴張劑併用。

2. 目前若正使用或最近使用 MAO 抑制劑時，必須特別謹慎。

3. 對於患有不穩定糖尿病患者，應小心使用本藥。

4. 本藥若用於患者最近有心肌梗塞及嚴重心臟或血管障礙，尤其使用超過推薦劑量時，必須在醫師指示下才可以使用。

5. 如同所有其他藥物，懷孕期間使用本藥亦須注意慣例的注意事項，本藥對於子宮收縮劑具有抑制作用，必須列入考慮。

6. 若治療不能產生預期效果，必須尋求醫師的指示，以便決定新的治療計劃。

7. 小孩只有在醫師的指示與成人的監督之下才可使用本藥。

副作用：

1. 本藥的耐受性良好，但偶爾會有輕微的手指震顫、不安或心悸發生。

2. 本藥曾經發現過偶有眩暈、疲勞、頭痛、出汗、口乾、心室障礙或心絞痛，若有此現象發生應減低劑量。

3. 若服用過量時會有下列症狀發生：潮紅、手指震顫、噁心、心跳過快、心縮壓增加、心舒壓降低、焦慮、興奮和可能發生期外收縮，若有此現象應立即中止服藥。

貯存：請存放於室溫、陰涼及兒童伸手不及之處所。

包裝：6~1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號