

G-6736 衛署藥製字第 043048

號

驅之敏膜衣錠 10 公絲

Setizin F.C. Tablets 10mg

(Cetirizine)

網號：E110

成分名：Cetirizine Dihydrochloride

劑型、劑量：Each F.C. Tablet contains：

Cetirizine Dihydrochloride...10mg

藥理作用：Cetirizine 為 Anti-H₁ 之抗過敏治療劑，且無明顯的 Anti-Cholinergic 及 Anti-Serotonin 作用，在有效劑量內 Cetirizine 不會通過腦血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

Cetirizine 的作用：

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 對內生性組織胺的釋出有抑制作用(如 48/80 之組織胺)。
3. 抑制由 VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide) 和 Substance P 所引起之過敏反應。
4. 抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞(例如：Eosinophils)的移動，而降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6. 顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。

這些作用，由心智測驗及 Quantified EEG 得知，對中樞神經不會產生任何作用。

藥物動力學：口服 Cetirizine 1 小時內，會達血中最高濃度。血漿半衰期成人約為 10 小時，6~12 歲的孩童約為 6 小時。成人及孩童的蓄積腎排泄量(Cumulative urinary excretion)約為投藥量的 2/3。通常孩童的血漿清除率要比成人為高。Cetirizine 的吸收並無個體差異。體內血漿濃度與投藥量成線性關係。

Cetirizine 與血漿蛋白具有很強的結合能力。

適應症：季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

用法用量：本藥須由醫師處方使用。

成人及 6 歲以上孩童適用。

晚餐時，口服 10 mg Cetirizine(即一錠)與液體併服。對副作用敏感之患者，改為早晚各服 5 mg Cetirizine(即半錠)。

禁忌症：對本藥成分有過敏者。

副作用：

1. 曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸道不適。
2. 由精神運動性(Psychomotor)的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine 的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。
3. Cetirizine 的過敏性徵狀極少被報導。

注意事項：

1. 在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精(血中酒精濃度為 0.8g/L 時)的作用，但應避免。
2. 孕婦及授乳婦：動物實驗上，尚無引起畸形胎之報告，但懷孕(尤其是前 3 個月)及哺乳的婦女請勿投與。
3. 藥物交互作用：至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。
4. 開車或操作機械：實驗證明，對正常人投與 20~25 mg/天的劑量，不會影響警覺及反應時間，但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。
5. 過量：超過 50 mg/次使用，會有安眠之症狀發生，無特殊之解毒劑，因此，如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

保存條件：請貯存於室溫、陰涼、乾燥、避免受潮，小孩接觸不到之處所。

包裝：6~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號