

號

中國化學/硫酸特必林

**鎮喘錠 2.5 公絲**

**Brandyl Tablets 2.5mg**

C.C.P.C. / Terbutaline sulfate

網號：C47

本劑主成分 Terbutaline sulfate 是一種腎上腺  $\beta$  感受器刺激劑( $\beta$ -Adrenergic receptor agonist)，專門作用在支氣管的平滑肌上，具有減輕氣喘發作，對於支氣管痙攣和支氣管疾病有很好的治療效果，口服本劑大約在 1 小時內，即可呈現支氣管擴張作用，而在 2~3 小時會達到最大效果，其持續治療效果會比其他類似藥物要長久，至少可持續 7 小時或更久。

成分：每錠中含有：Terbutaline sulfate...2.5mg

**適應症：**支氣管氣喘、支氣管炎、氣喘性支氣管炎、支氣管擴張症，及肺氣腫。

**用法、用量：**本藥須由醫師處方使用

1.成人：通常劑量每次 5mg，每天 3 次，起始劑量也可以用 2.5mg，每天 3~4 次。依治療效果來調整劑量，但每天以不超過 15mg 為原則。

2.小孩(12~15 歲)：每次 2.5mg，每天 3 次。

◎若治療初期效果不佳，則必須立即觀察是否有嚴重的氣喘，再做必要的治療評估。

**副作用：**一般的副作用和其他的擬交感神經胺藥物類似。

1.治療初期偶而會有顫抖，但在繼續治療時此症狀會消失，至於心悸症狀在減低劑量時也會緩和而逐漸消失。

2.其他尚有輕微的症狀如心跳次數加快，心悸，眩暈，頭痛，嗜眠，噁心，嘔吐，發

汗，肌肉痙攣性疼痛，這些反應通常很短暫，不需治療。

**注意事項：**

1.由於本劑為擬交感神經胺藥物，故對於有心臟血管病症的病人(包括有心律不整，冠狀血管不合或高血壓的病人)，甲狀腺機能亢進症，糖尿病或對此類藥物有不平常反應發生之病歷者，必須慎重投與。

2.應確實按照用法、用量使用，若效果不佳或不適當時應考慮中止使用，特別對於小孩投與的場合，更要密切觀察其反應現象。

3.本藥過度連續使用時，可能引起不整脈，甚至心跳停止之危險，故宜小心使用。

4.因為有關妊娠中投與之安全性尚未完成建立，故孕婦或可能有妊娠的婦女，應先衡量其治療利弊後，才可投與，妊娠三個月以內的婦女，除非不得已的場合，務必禁止使用。

**禁忌症：**對擬交感神經胺藥物嚴重過敏或有甲狀腺中毒症的病人。

**交互作用：**禁止與 Epinephrine 及 Isoproterenol 等 Catecholamine 類的藥物併用。因為可能引起不整脈或甚至心跳停止的現象。

**貯存：**遮光，密封，避免日光直射，室溫下貯存。

**包裝：**6~1000 粒瓶裝，盒裝。



**中國化學製藥股份有限公司**

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號