

中國化學製藥

配尼西林 V 片 400,000 單位

Penicillin V Tab. 400,000U

C.C.P.

網號：

D16

Potassium Phenoxymethyl Penicillin 為 Phenoxymethyl Penicillin (Penicillin V) 之水溶性鉀鹽，易為胃及十二指腸所吸收，而於服用後 15 分鐘內即可得有效高血中濃度，因此本劑雖經口服用可得與針劑一樣之迅速效果。

成分：每片含有：

Potassium Phenoxymethyl Penicillin
.....400,000Units

適應症：

對配尼西林具有感受性之微生物所引起之諸症狀，對革蘭氏陽性菌屬如肺炎球菌屬、鏈球菌屬、葡萄球菌屬等所引起之感染均有效。也可治療革蘭氏陰性菌、淋菌性感染。

用法：本藥須由醫師處方使用。

治療：

1. 溶血性鏈球菌及感受性葡萄球菌之感染：每日三次，每次 1/2 片~1 片。
2. 肺炎球菌之感染：每六小時 1 片。
3. 淋菌感染(男性之急性淋病尿道炎)：每四至六小時服用 1 片，淋病併發症，例如關節炎、心內膜炎、附睪炎等，需要提高劑量且延續治療期間。

嚴重感染時，劑量應依病人之感受而作適量之調整。

預防：

凡具有風濕性熱，風濕性心臟病，先天性心臟病等病歷之病人在扁桃腺切除及拔牙之後，為預防細菌性心內膜炎，應在手術前一天至手術後 4 天，每 8 小時服用 1 片。

注意：

抗生素之使用偶而會導致非感受性微生物之過度生長，因此治療時病人應被嚴密地觀察是否有新感染之病徵發生。假如有毒性及敏感性之症狀發生時，應立即停止投藥。除了具有氣喘病及相近過敏性病歷之病人以外，本劑之經口服用幾乎很少發生過敏反應。但急救藥物及設備(氧氣，腎上腺素，抗組織毒素針劑，人工呼吸器等)應隨時準備以應付過敏作用。

包裝：6~1000 片盒裝，瓶裝



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200

台中工廠：台中市工業區 15 路 10 號 B