

萬古利凡[®]凍晶靜脈注射劑 500 毫克 Vancomycin for I.V. Injection 500 mg[™]CYH[®]

網號：

概說：Vancomycin HCl(無菌 Vancomycin Hydrochloride USP)靜脈注射劑是由土壤線菌屬 *Amycolatopsis orientalis*(昔稱 *Nocardia orientalis*)菌株衍化而成之三環糖肽類抗生素。化學式為 $C_{48}H_{83}N_9O_{23}$ ·HCl；分子量為 1,485.73；500 mg base 相當於 0.34 mmol。小瓶內含有無菌 vancomycin hydrochloride，相當於 500 mg 之 vancomycin base，為白色至稀薄微黃之白色呈塊狀或粉末之凍晶乾燥品，加水溶解後，為澄明溶液，pH 值 2.5 至 4.5。本藥對氧氣敏感。

臨床藥理：依文獻記載，Vancomycin 為靜脈注射供全身性感染治療；口服吸收差，肌肉注射有疼痛感。腎功能正常下，給與 vancomycin 1 g 多次劑量(15 mg/kg)，做六十分鐘以上靜注，在灌注結束時，平均血中濃度約可達 63 mg/L；灌注後 2 小時，平均血中濃度約 23 mg/L，灌注終了後 11 小時，平均血中濃度約 8 mg/L。給與 500 mg 多次劑量，灌注三十分鐘以上，在灌注結束時，平均血中濃度可達 49 mg/L；灌注之後 2 小時，平均血中濃度約 19 mg/L；灌注後 6 小時，平均血中濃度約 10 mg/L；多次劑量投與時之血中濃度和單劑量一次投與時相似。在腎功能正常之下，從血漿中過濾之 vancomycin，半衰期為 4 至 6 小時。在最初 24 小時中，約有 75% 之 vancomycin 由腎絲球濾過自尿中排泄。平均血漿清除率為 0.058 L/kg/h，平均腎清除率約為 0.048 L/kg/h。腎功能障礙患者，會減緩 vancomycin 之排泄。腎不全患者，平均半衰期為 7.5 天，分佈係數為 0.3 ~ 0.43 L/kg。此藥在體內不易被代謝，口服透折時，在 6 小時內，腔內投與劑量約有 60% 可吸收分布至全身。腔內注射 30 mg/kg vancomycin，血清濃度約可達 10 mg/L。雖然利用血液透析或腹膜透析均不能有效地將 vancomycin 排除，目前已有用血液濾過和血液過濾增加 vancomycin 血清濃度之報告。Vancomycin 的全身性總清除率和腎清除率在老年期可能會低。在 vancomycin 血中濃度 10 至 100 mg/L 時，利用超濾法測得，有近乎 55% 之 vancomycin 與血清蛋白結合。靜脈注射 vancomycin hydrochloride 後，在胸膜、心包膜、腹水、關節液；尿液、腹膜透析液和心房組織液均達到抑制濃度。Vancomycin hydrochloride 不易經腎髓質擴散至脊髓中。但是，當腦脊髓液發生感染時，vancomycin hydrochloride 能穿入脊髓液。

微生物學—Vancomycin 之殺菌作用，主要是抑制細菌細胞壁的合成，除此之外，Vancomycin 還會改變細菌細胞膜之通透性和 RNA 的合成。Vancomycin 和其他抗生素之間，不會產生交叉抗藥性。Vancomycin 能有效地對抗葡萄球菌屬，包括金黄色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus* 和白色表皮葡萄球菌 *Staphylococcus epidermidis* (包括對 methicillin 具抗藥性之異株菌株)；鏈球菌屬，包括化膿性鏈球菌 *Streptococcus pyogenes*，肺炎鏈球菌 *Streptococcus pneumoniae*(包括對 penicillin 具抗藥性菌株)，乳乳鏈球菌 *Streptococcus agalactiae*，草綠色鏈球菌群 *Viridans* group，牛鏈球菌 *Streptococcus bovis* 和腸球菌屬 *Enterococcus faecalis* 昔稱 *Streptococcus faecalis*；難治梭狀桿菌 *Clostridium difficile*(如假膜性結腸炎相關之產毒菌株)；以及類白喉菌。其他體外試驗對 Vancomycin 具有感受性的菌株有革草綠增多性李斯特氏菌(*Listeria monocytogenes*)；乳酸桿菌屬(*Lactobacillus* species)，放線菌屬(*Actinomyces* species)，梭菌屬(*Clostridium* species)及芽孢菌屬(*Bacillus* species)。Vancomycin 與一些葡萄球菌及腸球菌的體外試驗結果，曾有抗藥性報告。對於革蘭氏陰性桿菌，分歧桿菌或微菌，體外試驗結果，Vancomycin 具活性。

協同作用—Vancomycin 與氨基糖苷(aminoglycoside)併用結果，體外試驗顯示，對抗金黄色葡萄球菌 *S. aureus*，非腸球菌 D 群鏈球菌，腸球菌和鏈球菌屬(草綠色鏈球菌群 *Viridans* group)等菌株，具有協同作用。

平準感受性試驗—依美國國家委員會之臨床試驗標準，使用 disc(平準)試驗 vancomycin 感受性之標定方法已被建議採用。標準 30 µg Vancomycin hydrochloride disk 的單一劑量感受性試驗結果應根據以下標準來判定：感受性菌所產生的抑制圈直徑大於或等於 12 mm，則此療法對試驗菌有效。細菌所產生的抑制圈為 10 或 11 mm，則為中度感受性。此類菌若感染局限在組織或體液，則高濃度的此抗生素可達治療效果。抗藥性菌產生的抑制圈小於或等於 9 mm，此療法對此菌無效，須選擇他種療法。使用稀釋法判定，如果最小抑菌濃度(MIC)值小於或等於 4 mg/L，則此分離菌為感受性菌。如果最小抑菌濃度(MIC)值大於或等於 16 mg/L，則此菌對 vancomycin 具抗藥性。如果最小抑菌濃度(MIC)值大於 4 mg/L 而小於 16 mg/L，則考慮其為中度感受性菌。標定方法須使用標準實驗室控制菌種。30 µg 的 vancomycin hydrochloride disk 對金黄色葡萄球菌 *S. aureus* ATCC 25923 所產生的抑制圈直徑應為 15 至 19 mm。使用稀釋法判定，稀釋法亦必須須使用實驗室控制菌種。Vancomycin 粉末標準品對金黄色葡萄球菌 *S. aureus* ATCC 29213 之最小抑菌濃度(MIC)值，應為 0.5 mg/L 至 2.0 mg/L。對異鏈球菌 *S. faecalis* ATCC 29212 之最小抑菌濃度(MIC)值範圍應為 1.0 mg/L 至 4.0 mg/L。

適應症：葡萄球菌感染所導致之內心膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血症、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

說明：Vancomycin hydrochloride 適用於對 methicillin 具有抗藥性(抗 β-lactam 類)之葡萄球菌所引起之嚴重或致命性感染。對 penicillin 過敏患者不能使用注射劑或口服劑。本品無效，包括 penicillins、cephalosporins 或治療無效患者，或是對其他抗菌劑具有抗藥性。而對 vancomycin 具感受性菌所引起之感染，Vancomycin hydrochloride 均適用。當懷疑感染的是由對 methicillin 具有抗藥性之葡萄球菌所引起，Vancomycin hydrochloride 可作為初期療法，但感受性試驗有了結果之後，療法應做適當調整。使用 vancomycin hydrochloride 治療葡萄球菌所導致之內心膜炎效果良好。對其他因葡萄球菌引起的感染包括敗血症、骨感染、下呼吸道感染、皮膚和皮膚組織感染亦有療效。當葡萄球菌感染症局部化膿，抗生素可用來做適當外科處置之輔助療法。單獨使用 vancomycin hydrochloride 治療葡萄球菌 *S. Viridans* 或 *S. bovis* 所引起之內心膜炎，應使用氨基糖苷(aminoglycoside)治療，效果均佳。有報告指出，由腸球菌 enterococci(如：腸球菌 *E. faecalis*)所引起之內心膜炎，使用 vancomycin hydrochloride，則須併用氨基糖苷(aminoglycoside)方有療效。類白喉桿菌性內心膜炎，使用 vancomycin hydrochloride 治療有效。Vancomycin hydrochloride 與 rifampin、aminoglycoside，或兩者一起併用，於植入人工瓣膜後白色表皮葡萄球菌或類白喉桿菌引起之內心膜炎初期，療效頗佳。取樣作細菌培養時，須取到菌種，才能分離確認出致病菌，以判定其對 vancomycin hydrochloride 之感受性。Vancomycin hydrochloride 注射劑劑型可用於口服治療，由於長期服用廣效性抗菌素由難治梭狀桿菌 *C. difficile* 引起之假膜性結腸炎，單獨注射 vancomycin hydrochloride 對此效能之益處尚未確定。口服 vancomycin hydrochloride 則對其他感染無效。患有先天性心臟病、風濕熱或後天瓣膜性心臟病，並對 penicillin 過敏之患者，在進行牙科手術或呼吸道外科手術時，建議使用 vancomycin hydrochloride 靜脈注射，來預防細菌性內心膜炎。此為美國心臟協會及牙科醫學會所建議使用，但目前尚無足夠對照之臨床療效研究支持。注意：選用抗生素預防細菌性內心膜炎時，醫師或牙醫師應事先仔細閱讀美國心臟協會及牙科醫學會的共同聲明。

禁忌：依文獻記載，對 vancomycin hydrochloride 過敏之患者禁用。

警語：依文獻記載，快速過量投與(如，數分鐘內)，可能產生嚴重低血壓及罕有的心跳停止。Vancomycin hydrochloride 應與稀釋劑混合成溶液來投與，注射時間須達六十分鐘以上，以避免快速灌注引起反應發生。通常停止灌注，此反應很快會消失。投與 vancomycin hydrochloride，曾有耳毒性發生，有可能是暫時性或是永久性。有此報告之大多數患者為投與過量或本有失聰現象，或是與他種耳毒性藥劑(aminoglycoside 併用)腎不全患者使用 vancomycin 時須多加注意，因腎毒性的危險性，隨長期、高血中濃度有稍微增加傾向。腎功能障礙患者，vancomycin hydrochloride 使用劑量必須加以調整。(請參見注意事項及用法用量欄)幾乎所有抗菌劑(包含 vancomycin)都曾假設性結腸炎與劑量，其嚴重程度由輕到具生命威脅性。故在診斷使用抗菌劑時發生的腹痛應特別小心。抗菌劑治療會改變正常菌群且可能造成桿菌過度生長。研究指出難治梭狀桿菌產生的毒素是引起「抗生素性腸炎」的主因，當診斷確定假膜性結腸炎時，應開始治療。輕微的假膜性結腸炎通常祇要停藥即可。中重度到嚴重的病例則須考慮使用電解質、蛋白質補充及以臨床抗難治梭狀桿菌有效的抗菌藥物治療。Vancomycin 須小心使用在對 teicoplanin 過敏之患者，曾有過敏性交互反應於 vancomycin 和 teicoplanin 兩劑間的報告。

注意事項—依文獻記載

- 1. 本藥具耳毒性及腎毒性，腎衰竭患者應小心使用。長期使用或血中濃度過高可能增加毒性的危險，此類患者使用本藥，其每日劑量應少於 2 公克即可達到理想的血中濃度。
- 2. 已失聰患者應避免使用本藥，若需使用則應調整劑量，並定期檢查血中濃度。耳鳴以後可能失聰，停藥後可能仍持續。尤其老年患者較易發生聽覺損害。
- 3. 併用其他神經毒性或腎毒性藥劑如 STREPTOMYCIN, NEOMYCIN, KANAMYCIN, GENTAMICIN, CEPHALORIDINE, PAROMOMYCIN, VIOMYCIN, POLYMYXIN B, COLISTIN, TOBRAMYCIN, AMIKACIN 時，應特別小心。
- 4. 腎衰竭和超過六十歲之患者，必須連續做聽力和血中濃度試驗。所有使用本藥之患者應定期做尿分析和血液、肝機能、腎機能檢查。
- 曾有報告指出在多劑量口服投與 vancomycin 治療難治梭狀桿菌 *C. difficile* 產生的假膜性結腸炎時，患者的血清濃度是有臨床上的意義。長期使用 vancomycin hydrochloride，可能導致非感受性菌的過度生長。小心觀察病人是很重要的。治療期間若發生重複感染，須採取適當處置。為了使腎毒性的危險性減至最低，治療老年腎功能障礙病人或是重症時同時併用 aminoglycoside 治療時，必須連續監視其腎功能，並依下述劑量表給予特殊治療。(請參見用法用量欄)為了使耳毒性的危險性減至最低，連續做聽力功能試驗，也許有所助益。投與 vancomycin hydrochloride，有發生可逆性嗜中性白血球減少症的報告(請參見副作用欄)所以病患將進行 vancomycin hydrochloride 長期療法或是併用之藥物會產生嗜中性白血球減少症時，應定期監測白血球數。Vancomycin hydrochloride 對組織有刺激性；務必採安全的靜脈注射投與劑量。肌肉注射 vancomycin hydrochloride 或是不慎溢出血管外，會發生疼痛、腫痛及壞死現象。血栓性靜脈炎可能發生，但若以稀釋溶液(2.5-5g/L)徐緩注射並定期改變灌注部位，則此反應發生的頻率和嚴重性能減至最小。與麻醇藥同時投與，灌注相關症狀(包括高血壓、面潮紅、紅斑、荨麻疹和瘙癢症)發生的頻數，有增加的報告。在麻醇誘導之前，給與 vancomycin hydrochloride 輸注六十分鐘，則此灌注相關症狀的發生率，能減至最低。椎管內(腰椎內或腦室內)投與的安全性和有效性，尚未評估。報告顯示 vancomycin hydrochloride

經由腹膜腔內之投與途徑做腹膜透析(CAPD)，會產生化學性腹膜炎症狀，至今，此症狀程度由僅有混濁透析物，至混濁透析物外，還伴隨不同程度之腹痛和發燒。若終止腹膜腔內投與 vancomycin，則僅有短暫的症狀。藥物交互作用—麻醇劑和 vancomycin 併用投與，曾有紅斑和類似組織胺面潮紅(請參見注意事項欄兒童使用和類過敏反應)。(請參見副作用欄)

同時併用和/或持續全身性或局部投與其他具有潛在神經毒性和/或腎毒性藥物，如 amphotericin B，aminoglycosides，bacitracin，polymyxin B，colistin，viomycin 或 cisplatin 對症給與 vancomycin 時，須小心監聽。懷孕期間使用—此藥尚未有動物生殖研究，未知是否會影響生育力。在一對照試驗，給予孕婦 vancomycin hydrochloride 治療嚴重葡萄球菌感染，並過量使用靜脈注射藥物，以評估對嬰兒潛在的耳毒性和腎毒性作用，結果在帶菌血中有發現 vancomycin hydrochloride，但並無發生感覺神經性失聰或腎毒性歸因於此藥的案例。有一嬰兒，其母親於懷孕第三期使用 vancomycin hydrochloride，有傳導性失聰，但非由 vancomycin hydrochloride 所致。在此研究中，因病人數目有限，且只在懷孕第二期及第三期投與 vancomycin hydrochloride，故此藥是否會導致胎兒傷害，目前仍未得知。除非確實需要時，才給孕婦投與此藥。授乳母親—Vancomycin hydrochloride 會自母乳中排泄，故當給一授乳婦人此藥時，須十分注意。由於有副作用發生的可能，故須斟酌藥物對母親的重要性，決定是否停止授乳或停藥。

兒童使用—對早產兒和嬰兒，使用 vancomycin hydrochloride，能穩定嬰兒之血清濃度，也許是適當的。同時投與 vancomycin 和麻醇劑，兒童會伴有紅斑和類似組織胺面潮紅現象。(請參見副作用欄)

老年人使用—隨年齡增加，腎絲球濾過作用的自然衰退，如果劑量不調整，vancomycin 的血清濃度可能會提高。老年人使用 vancomycin 劑量須作調整。(請參見用法用量欄)

副作用：依文獻記載

可能發生噁心、發冷、發熱、蕁麻疹、紅斑、嗜酸性球增多、類過敏反應和非感受性細菌過度繁殖等。若給藥期間因其他細菌或菌叢的存在而引起其他感染時，應做適當之處置。

本藥對組織之刺激性大，肌肉注射能破壞死，必須靜脈注射。靜脈注射又能引起疼痛及導致血栓性靜脈炎，以葡萄糖溶液或生理食鹽水稀釋和變換注射部位，可降低其發生率。

灌注相關症狀—在快速灌注 vancomycin hydrochloride 時或之後，病患有可能發生類過敏反應症狀，包括高血壓、喘鳴、呼吸困難、蕁麻疹或瘙癢症。快速灌注也可能發生身體上部潮紅(Red Man Syndrome)或疼痛或胸部或背部肌肉痙攣。這些反應通常在二十分鐘以內消失，也有可能持續數小時。如果徐緩給藥，灌注六十分鐘以上，則罕見這些反應發生。

腎毒性—罕見腎衰竭，主要為血清肌酸酐(serum creatinine)或尿素氮(BUN)濃度增加的報告。特別是投與大量 vancomycin hydrochloride 的病人尤甚。罕有間質性腎炎的報告，大多數病人都是原本即有腎功能障礙或是與 aminoglycoside 併用。大多數病人在停藥時，血肌酐(azotemia)即消失。

腎臟進一步假膜性結腸炎的出現，可能發生在抗生素治療期間或之後。(請參見警語欄)

耳毒性—有產生失聰的報告，大多數病人為腎功能障礙或原本有失聰或同時具有耳毒性的藥物併用治療。罕有頭暈、眩暈、耳鳴現象。

造血方面—Vancomycin hydrochloride 療法開始進行一週或數週，或是總投與劑量超過 25 g 時，有發生可逆性嗜中性白血球減少症的報告。當停藥時，嗜中性白血球減少現象會立即恢復正常。罕見血小板減少症。罕見顆粒性白血球減少症(顆粒性白血球數小於 500/mm³)，但其因果關係尚未確定。

靜脈炎—有注射部位發炎報告。

其他一偶有過敏反應(anaphylactaxis)、藥物熱、噁心、寒戰、嗜伊紅血球增多、皮膚疹(包括剝脫性皮膚炎)、linear IgA bullous dermatosis、Stevens-Johnson 徵候、毒性表皮壞死和罕見的血管炎發生的報告。

經由腹膜腔內之投與 vancomycin，有會產生化學性腹膜炎的報告。(請參見注意事項)

服藥過量：依文獻記載，需小心監督，給予適當處理，維持正常腎絲球濾過作用。Vancomycin 不易從透析中移除。用離子交換樹脂 polysulfone resin 進行血液透析及血液灌流，據報有助於增加 vancomycin 從體內排泄。大鼠的靜脈注射半致死劑量為 319 mg/kg，白鼠為 400 mg/kg。在處理腹膜炎時須考慮多重藥物過量的可能性，藥物與藥物間的相互作用，以及在病人體內不尋常的藥物動力學(drug kinetics)。

用法用法：本藥限由醫師使用。灌注相關症狀與 vancomycin 投與的濃度及注射速率有關，使用於成人，建議濃度不超過 5 mg/mL，速率不超過 10 mg/min(請參見年齡—特殊建議欄)。對一些選擇性的患者，有液體需要上的限制，則使用濃度可高至 10 mg/mL；像使用如此高的濃度或許會增加灌注相關症狀的發生。然而，灌注相關症狀或許會發生在任何速率和濃度。

腎功能正常患者：
成人—通常一日劑量 2 g 靜脈注射，分次投與，可每 6 小時注射 500 mg 或每 12 小時注射 1 g。每次劑量注射速率不超過 10 mg/min。並依患者年齡、肥胖等情況，每日劑量予調整。
兒童—通常靜脈注射與量，每 6 小時注射 10 mg/kg 體重。每次劑量注射的時間，至少須六十分鐘以上。
嬰兒及新生兒—新生兒及嬰兒，每日靜脈總投與量可能較低。建議新生兒及嬰兒使用量，開始劑量約為 15 mg/kg，接著新生兒 10 mg/kg 劑量，第一週內每 12 小時投與一次，其後至一個月大，每 8 小時注射一次。每次劑量注射的時間，至少須六十分鐘以上。需作嚴重 vancomycin 血清濃度監視。

腎功能不全患者及老年患者：腎功能不全患者劑量須作調整。早產兒及老年患者，因腎功能減低可能必須減少比預估還多的劑量。測量其 vancomycin 血清濃度，有助於治療的改善，尤其是對腎功能改變的重症患者。Vancomycin 的血清濃度測定法有微生物測定法，放射免疫測定法，螢光極化免疫測定，螢光免疫測定，或高壓液相層析法。

大多數腎不全患者，若肌酸酐(Creatinine)可測出或正確估計出，使用量可按下表計算。Vancomycin hydrochloride 每日劑量(mg)，約為腎絲球濾過率(mL/min)的 15 倍。(請看下列)腎功能不全患者 Vancomycin 劑量表(取自 Moellering 等)

肌酸酐清除率 (mL/min)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Vancomycin 劑量 (mg/24hr)	1,545	1,390	1,235	1,080	925	770	620	465	310	155

中重度至重度腎不全患者亦同。

上表不適用於機能性腎組織缺乏患者。對此患者投與之初劑量應為 15 mg/kg 體重，才能立即達到治療血清濃度。投與劑量為 1.9 mg/kg/24hr 以維持穩定濃度。對於嚴重腎不全患者，數天給與一次 250 mg 至 1,000 mg 單一劑量可能較為方便，而不是以每天需求為準。無尿患者，建議使用劑量為每 7 至 10 日，投與 1,000 mg 一劑量。當只有血清肌酸酐(Serum Creatinine)數據值，以下列表(根據患者的性別、體重、年齡)可導出肌酸酐清除率(Creatinine Clearance)。計算出的肌酸酐清除率(Creatinine Clearance mL/min)只為約略值，此值以下列公式換算。

男性： $\frac{\text{體重(公斤)} \times (140 - \text{年齡})}{72 \times \text{血清肌酸酐濃度(mg/dL)}}$ 血清肌酸酐應代表在穩定狀況下的腎功能，否則肌酸酐清除率預測值不能採用。下述情況會對病人的清除率估計過高(1)具有腎功能減退徵候，如休克、嚴重心臟衰竭或尿量減少。(2)肌肉質量與身體體重不呈正常比例。

女性： $0.85 \times$ 以上數據

例，如肥胖患者或肝、腎、水腫、腹水患者。(3)併有衰弱、營養不良或無活動力現象。

Vancomycin 鞘內注射(腰椎內或腦室內)投與途徑的安全性和有效性尚未評估。建議投與方法是間歇灌注。

注射液之配製及安全性：依文獻記載使用時，加入 10 mL 滅菌注射用水於 500 mg 無菌 vancomycin 乾品之小瓶內。以此法調得 50 mg/mL 的溶液，須進一步稀釋。溶液調配之後需冷藏，可於冰箱中保存 4 天而不會明顯降低力價。調配 vancomycin 500 mg 至少需要 100 mL 的稀釋液來稀釋，將所需劑量以此法調配，間歇靜脈注射至少須六十分鐘以上。相容的靜脈注射液—用 5% Dextrose Injection 或 0.9% Sodium Chloride Injection 稀釋的溶液可冷藏 14 天。不會明顯降低力價。用下列輸注液稀釋的溶液可冷藏 96 小時：5% Dextrose Injection 和 0.9% Sodium Chloride Injection, USP；Lactated Ringer's Injection, USP；Lactated Ringer's 和 5% Dextrose Injection；Acetated Ringer's Injection。

由於 vancomycin 溶液的 pH 值低，與其他成分配合可能造成化學性或物理性的不穩定。Vancomycin 溶液與 β-lactam 抗生素的混合物出現物理上不相容性，沉澱物會隨 vancomycin 濃度增高而增加。建議在分別投與這二種抗生素之前，先在投與第一種抗生素之前，充分地沖洗輸注裝置。也有建議將 vancomycin 溶液稀釋至 5 mg/mL 或更低。雖然玻璃體內注射不是標準的 vancomycin 投與途徑，曾有研究使用不同針筒進行玻璃體內注射 vancomycin 和 cefazidime 治療眼內炎，發生沉澱的報告。然而這些沉澱漸漸溶解，玻璃體腔兩個月後亦會完全清淨，且視力獲得改善。非經消化道投與之藥物，當溶液或容器能用肉眼來檢查時，使用前都應檢視其有無顆粒物質和變色現象。

口服投與—口服 vancomycin hydrochloride 是用來治療併發抗生菌素或由難治梭狀桿菌所致假膜性結腸炎和葡萄球菌所引起之結腸炎，但對其他的感染無效。成人通常一天劑量 500 mg 2 次，分三次或四次，投與七到十天；兒童一天劑量為每斤體重 40 mg，分三次或四次，投與七到十天；一天的總劑量不要超過 2 g。可將適當劑量用水稀釋至 1 盎司(30 mL)給患者喝，一般調味糖漿可加入此溶液以改善口味的味道，此溶液也可藉由鼻胃管投與。

保存條件：30°C 以下保存。

包裝：500 毫克小瓶裝，100 支以下盒裝。