

Size: 113mmX165mm

施美® **百潔碘軟膏** 衛署藥製字第029286號  
網號：H45

C.B.® **Biodyne Ointment** 外用  
(Povidone- Iodine)

**有效成分：** 每公克含有

有效成分	含量
Povidone Iodine (相當於有效碘)	100mg 10mg)

其他成分(賦形劑)：PEG 4000、PEG 300

**用途(適應症)：**  
緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的消毒、殺菌來防止傷口的感染。

**使用上注意事項：**

- 一、有下列情形者，請勿使用：  
曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：  
(一) 3歲以下。  
(二) 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：  
兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項  
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。  
(二) 避免陽光直射。  
(三) 勿超過建議使用量或使用次數。  
(四) 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。  
(五) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。  
(六) 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。  
(七) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。  
(八) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。  
(九) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。  
(十) 有全身性吸收之可能，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

(十一) 會使皮膚或衣物染色。

**用法用量：**

一日數次	塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹
------	---------------------

**警語：**


- 一、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：  
(一) 若有上述外之其他不適情況產生。  
(二) 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。  
(三) 使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

**包裝：**  
1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

**儲存條件：**  
於室溫(30°C以下)處保存，並置於孩童無法觸及之處。

製造廠  
**中國化學製藥股份有限公司**  
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號  
http://www.ccpq.com.tw  
總公司：台北市義陽路23號TEL：(02)23124200

總經銷  
**中化裕民健康事業股份有限公司**  
Chunghwa Yuming Healthcare Co., Ltd.  
台北市中正區義陽路23號8樓



中文字:文鼎新中黑  
英文:Arial  
藍字:10級 黑字7.5級