

外用

G-11477 衛署藥字第 056808 號

擴潔 殺菌液 2% Chlorhexidine CCPC Antiseptic Liquid 2%

無色/藍色

網號：F46/F49

【成分】

有效成分及含量

每mL中含：

20%Chlorhexidine Gluconate Solution.....0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate.....20 mg)

其他成分（賦形劑）：

(無色)：Isopropyl alcohol、PPG-12-PEG-50 Lanolin、Tween 20、Citric acid hydrate、Water purified

(藍色)：Isopropyl alcohol、PPG-12-PEG-50 Lanolin、Tween 20、Citric acid hydrate、Color Blue #1、Water purified

【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【用法用量】

皮膚消毒抗菌用，使用時不用稀釋，塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【使用上注意事項】

●有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分過敏的人。

●有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 深部皮膚組織感染。

●有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

●其他使用上注意事項

1. 須置於小孩接觸不到之處。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 勿超過建議劑量。

4. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

5. 不可與清潔劑或其他化學藥品混合。

6. 本產品係以酒精 (Isopropyl alcohol) 為基劑，應避開火源。

7. 本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

8. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

10. 勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。

【警語】

一. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應

二. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 使用後自覺狀況未改善或更惡化。

2. 若有任何不適情形發生。

【包裝】4000 ml 以下塑膠瓶裝

【貯存】請置放於 25°C 以下乾燥場所。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號