

■ 中化製藥動藥處 製品目錄
2020 PRODUCT CATALOG



CCPC

中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心·為動物鋪上健康之路

Poultry Drugs

家禽用藥品

泰利美寧	Trimerin	Powder	1
泰利美寧48%	Trimerin 48%	Solution	1
戴克球滅散劑	Diclazol Powder	Powder	2
嘑滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	2
嘑滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	3
樂蟲滅散	Lepicom	Powder	3
滅球贊1%	Meacozan 1%	Powder	4
特球除2.5%	Toltracox 2.5%	Oral Sol.	4
安西林鈉乾粉注射劑	Ancillina	Injection	5
配尼黴素-S 懸濁注射液	Penimycin-S	Injection	5
林可黴素-300注射液	Lincomycin-300	Injection	6
可賜興-150注射劑	Cotusin-150	Injection	6
嘉黴素-100注射液	Kanamycin-100	Injection	7
嘉黴素-250注射液	Kanamycin-250	Injection	7
泰樂新注射液	Tylosin	Injection	8
新感冒靈-S注射液	Neo-Coldenin S	Injection	8
安期B-25消毒劑	Anti B-25	Solution	9
百潔碘-30消毒劑	Biodyne-30	Solution	9
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	10
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	10
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	11
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	11
賜福素散	Cephalin	Powder	12
賜福素散	Cephalin	Powder	12
可立使淨-120	Colistin-120	Powder	13
林可黴素 40%	Lincomycin 40%	W.S.Powder	13

Poultry Drugs

家禽用藥品

可賜興－666	Cotusin-666	W.S.Powder	14
多欣－200	Doxin-200	W.S.Powder	14
雅黴素飲水劑	Erymycin WSP 500	W.S.Powder	15
獲利欣10%	Floricin 10%	Solution	15
泰康欣 250	Tiacosin 250	Solution	16
富鯤口服液20%	Furich Sol. 20%	Solution	16
經四環素－500	Oxytetracycline-500	W.S.Powder	17
泰樂新水溶性散	Tylosin WSP	W.S.Powder	17
中化泰妙素 20%	C.C.P.C. Tiamulin 20%	Powder	18
中化泰妙素 20%	C.C.P.C. Tiamulin 20%	Powder	18
泰黴素－220	Tylosin-220	Powder	19
克嗽靈	Cousorin	Powder	20
克嗽靈	Cousorin	Powder	20

家禽用藥品

Poultry Drugs

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	N170850	E041418
品名	<p>泰利美寧® Trimerin® Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>	<p>泰利美寧48%® Trimerin 48%® Solution</p> <p style="text-align: right;">500mL/Btl</p>
成份	<p>Each gm contains :</p> <p>Sulfadimethoxine....400 mg</p> <p>Trimethoprim....80 mg</p>	<p>Each mL contains :</p> <p>Sulfadiazine....400mg</p> <p>Trimethoprim....80mg</p>
說明	<p>適應症</p> <p>豬：各種細菌性下痢、黃白痢、MMA綜合症、細菌性肺炎、關節炎、鼻炎。</p> <p>雞：細菌性下痢、白痢、傳染性可利查、家禽霍亂、大腸桿菌症。</p> <p>用法用量</p> <p>控制： 每噸飼料添加本品250gm</p> <p>治療： 每噸飼料添加本品400gm</p> <p>※ 停藥期：15天。</p>	<p>適應症</p> <p>治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、巴斯德桿菌症或傳染性可利查</p> <p>用法用量</p> <p>雞：在500公升飲水中加入本劑200mL。</p> <p>豬：在400公升飲水中加入本劑200mL。</p> <p>連續使用5天或至症狀消失2天後，勿超過14天。</p> <p>※ 停藥期：5天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

產品		
製品編號	N201367	N151330
品名	戴克球滅散劑® Diclazol Powder® Powder 20kg/Bag	嘑滅諾 5%® Flumeizole 5%® Powder 600gm/Bag
成份	Each kg contains: Diclazuril..... 5 gm (pot.)	Each gm contains : Flubendazole...50 mg
說明	<p>適應症</p> 雞： 球蟲病的預防及治療。 <p>用法用量</p> 雞建議劑量： 1. 於穿梭計劃中之後期料，每噸添加本品200gm，相當於1ppm。 2. 於治療球蟲病蔓延時，添加量可提高1.5-2 ppm。	<p>適應症</p> 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。 <p>用法用量</p> 豬：1. 個別驅蟲：5mg(1gm/10kg 體重)一次給予。2. 集體驅蟲：驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3. 預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1. 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2. 驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3. 驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。
處方藥別	第三類	

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N151323</p>	<p>N151000</p>
<p>品 名</p>	<p>嘑滅諾 5%[®] Flumeizole 5%[®] Powder 25kg/Bag</p>	<p>樂蟲滅散[®] Lepicom[®] Powder 1kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Flubendazole....50 mg</p>	<p>Each gm contains : Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....100mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬：1. 個別驅蟲：5mg(1gm/10kg 體重)一次給予。2. 集體驅蟲：驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3. 預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1. 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2. 驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3. 驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。</p>	<p>適應症 豬：蛔蟲及其移行性幼蟲，肺蟲、鞭蟲、腸類圓蟲(淡紅豬圓蟲及結節線圓蟲屬)、類腸圓蟲(藍森桿蟲)。 牛、羊：肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、結節線圓蟲、枯貝氏蟲、線蟲。 家禽：蛔蟲、雞盲腸蟲、毛細線蟲。</p> <p>用法用量 豬：依下列用量溶於飲水中，體重100公斤以下，每20公斤體重給予1公克，體重100公斤以上，每頭給予5公克。 牛：每200公斤體重給予10公克溶於水中灌服。 家禽：每公斤體重給0.2~0.25公克溶於飲水中。 ※停藥期：7天，乳品：72小時。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

家禽用藥品

Poultry Drugs

驅蟲劑

Anthelmintics

產品		
製品編號	N000089	N201185
品名	滅球贊1% [®] Meacozan 1% [®] Powder 20kg/Bag	特球除2.5% [®] Toltracox 2.5% [®] Oral Sol. 1000mL/Btl
成份	Each kg contains : Maduramicin ammonium eq. to Maduramicin....10gm(potency)	Each mL contains: Toltrazuril.....25mg
說明	<p>適應症 肉雞：預防球蟲病。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加產品0.5kg~0.7kg(相當於5ppm~7pp) ※ 停藥期5天。</p>	<p>適應症 控制或治療種禽球蟲病如E. acervulina, maxima, brunetti, mivati, necatrix, tenella。</p> <p>用法用量 根據動物日齡及飼養環境，每公升飲水添加1mL本品，連用兩天；或每公升飲水添加3mL本品，每天8小時，連用兩天。 本品標準添加量為每公斤活體重使用7mg的Toltrazuril連續兩天。 ※ 停藥期：8天</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

注射劑

Injection

產品		
製品編號	E000115	E002123
品名	<p>安西林鈉乾粉注射劑[®] Ancillina[®] Injection</p> <p>12.5gm/10vial</p>	<p>配尼黴素-S 懸濁注射液[®] Penimycin-S[®] Injection</p> <p>100mL/10vial</p>
成份	<p>Each vial contains :</p> <p>Ampicillin Sodium....12.5gm(potency)</p>	<p>Each 2mL contains :</p> <p>Procaine Penicillin G....400,000 I.U.</p> <p>Dihydrostreptomycin Sulfate....0.5gm(potency)</p>
說明	<p>適應症 治療家禽畜由鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、變形菌等引起之感染症。</p> <p>用法用量 以注射用水溶解後行肌肉注射。</p> <p>1. 家畜：按體重每公斤每日注射10~20mg，2~3天，嗜血桿菌症30 mg。視動物種類、體重、症狀，增減劑量。</p> <p>2. 家禽：按體重每公斤每日注射10~20mg 2~3天。</p> <p>※停藥期：5天，乳汁：72小時。</p>	<p>適應症 各型革蘭氏陽性菌與陰性菌混合感染症、肺炎、肺疫、腸炎、下痢、丹毒、化膿症、乳房炎、中耳炎、子宮內膜炎、心內膜炎、關節炎、產褥熱、運輸熱、火傷、腺疫、尿道感染症、破傷風、犬瘟熱二次感染症、家兔梅毒、炭疽菌症、放線菌症、螺旋鈎端體症及其他各種炎症。</p> <p>用法用量 家畜：牛、馬 10~30mL。大豬 4~10mL。中豬 2~4mL。小豬 1~2mL或每公斤0.02~0.04mL計算。</p> <p>家禽：0.05~0.5mL/隻。</p> <p>依體重症狀增減行肌肉注射，連續治療2~3天。</p> <p>※停藥期：14天。</p>
處方藥別	第二類	第二類

家禽用藥品

Poultry Drugs

注射劑

Injection

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000509</p>	<p>E000011</p>
<p>品 名</p>	<p>林可黴素-300注射液[®] Lincomycin-300[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>可賜興-150注射劑[®] Cotusin-150[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Lincomycin HCL.....300mg(potency)</p>	<p>Each mL contains : Lincomycin Hcl monohydrate..... 50mg (potency) Spectinomycin Sulfate tetrahydrate.....100mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療革蘭氏陽性菌及其它具感受性細菌所引起之感染症：如細菌性肺炎、氣管炎、CRD、可利查、中耳炎、膿胸、細菌性腦膜炎、蜂窩組織炎、膿瘍、細菌性敗血症、放線菌症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~20mg之用量每日1~2次，依症狀增減。行肌肉注射或靜脈注射投藥，每日一次。 ※停藥期：7天。</p>	<p>適應症 ◎豬：治療感受性細菌所引起之傳染性關節炎，感受性細菌。◎雞及火雞：治療黴漿菌屬和/或大腸桿菌感染引起之氣囊病，家禽霍亂，雛火雞的阿利桑納(副結腸)感染，以及葡萄球菌感染。◎犬：治療呼吸道感染，皮膚病，尿路感染，以及續發性細菌性感染。</p> <p>用法用量 ◎豬：治療關節炎、腸炎或黴漿菌性肺炎， 1mL/10kg BW，IM，連續 3~7天。放線桿菌胸膜肺炎，0.2mL/kg BW，連續3天。◎雞及火雞：0.2mL/kg BW，SC，連續3天。◎犬：1mL/5kg BW，IM，每天1~2次。 ※停藥期：21天，雞16週齡以上、產蛋中之蛋雞不得使用。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

家禽用藥品

Poultry Drugs

注射劑

Injection

產品		
製品編號	E001294	N001224
品名	<p>嘉黴素－100注射液® Kanamycin-100® Injection 100mL/10vial</p>	<p>嘉黴素－250注射液® Kanamycin－250® Injection 100mL/10vial</p>
成份	<p>Each mL contains : Kanamycin Sulfate....100mg(potency)</p>	<p>Each mL contains : Kanamycin Sulfate....250mg(potency)</p>
說明	<p>適應症 急慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~30mg，每日一次行肌肉注射或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。 ※停藥期：30天。</p>	<p>適應症 治療家禽： 急慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、支氣管炎、氣囊炎、滑膜炎、細菌性下痢。</p> <p>用法用量 1.牛、馬、山羊、綿羊: (每公斤體重:0.02~0.04mL)。 2.豬、狗、貓、兔、家禽: (每公斤體重:0.04~0.08mL)。 每日一次施行肌肉或皮下注射，可連續用2~3天。</p>
處方藥別	第二類	第二類

家禽用藥品

Poultry Drugs

注射劑

Injection

產品		
製品編號	E003746	E111753
品名	<p>泰樂新注射液® Tylosin® Injection 100mL/10vial</p>	<p>新感冒靈-S注射液® Neo-Coldenin S® Injection 100mL/10vial</p>
成份	<p>Each mL contains : Tylosin Tartrate....50mg (potency)</p>	<p>Each mL contains : Chlorpheniramine Maleate....2.5mg dl-Methyl Ephedrine HCL....20mg Sulpyrin....150mg</p>
說明	<p>適應症 對禽畜革蘭氏陽性、陰性，類胸膜炎細菌(P.P.L.O.)引起之疾患均具藥效。家禽之慢性呼吸道疾病、支氣管炎、喉炎、肺炎、細菌性感染症。家畜之肺炎、白喉、子宮炎、腐蹄症、豬丹毒、細菌性下痢及手術或創傷後併發感染症。</p> <p>用法用量 牛：每50kg體重2~4mL 豬：每50kg體重2~8mL 初生豬：每kg注射0.2~0.5mL 家禽：每kg注射0.2~0.5mL 每日一次，按體重症狀增減肌肉注射。 ※停藥期：牛：8天，豬：4天，肉雞：3天，火雞：5天，乳汁：96小時。</p>	<p>適應症 一般感冒、伴有發熱咳嗽之感冒、流行性感冒、肺炎、支氣管炎、咳嗽、氣喘、傷寒及其它疾病引起之發熱疼痛均可使用。</p> <p>用法用量 牛、馬：(大)10~25 mL，(小)：5~10 mL 大豬：5~10mL 中豬：2~5mL 小豬：0.5~2mL 羊、犬、貓：1~5mL 雞、火雞(不含蛋雞)：每公斤0.1 mL 按體重症狀每日1~2次，行皮下或肌肉注射。 重症時配合化學治療法製劑使用，效果更佳。</p>
處方藥別	第二類	第一類

家禽用藥品

Poultry Drugs

消毒劑

Disinfectant

產品		
製品編號	E141615	E140267
品名	安期B-25消毒劑® Anti B-25® Solution 4L	百潔碘-30消毒劑® Biodyne-30® Solution 3.8L
成份	Each mL contains : Benzalkonium Chloride....250mg	Each mL contains : Available Iodine (Nonoxynol-9 Iodine 20%)....30mg
說明	<p>適應症</p> <p>本品主成份Benzalkonium Chloride 是一種陽離子界面活性劑，為目前最理想的消毒劑之一，在各國藥典及其他重要醫藥書籍中，均有詳細記載與推薦。可用於一般消毒、傷口沖洗、殺菌及消除黴菌、病毒的感染。</p> <p>消毒殺菌劑、雞舍、豬舍、畜體、水池、鰻池、農牧場舍、手術器具之清潔殺菌消毒。</p> <p>用法用量</p> <p>畜舍消毒：800~1200倍噴洗。 器皿消毒：500~1000倍浸洗。 水池消毒：2000~4000倍。</p>	<p>適應症</p> <p>本品適用於禽、畜舍之豬傳染性胃腸炎(TGE)、傳染性支氣管炎(IB)、慢性呼吸器病(CRD)、新城雞病(ND)、假性狂犬病(PR)、豬水泡病(SVD)等病原、畜體、禽畜用器具等之消毒。</p> <p>用法用量</p> <p>稀釋倍數，請詳閱說明書。</p>
處方藥別		

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution


產品		
製品編號	E001524	E001672
品名	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder</p> <p>20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder</p> <p>1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。</p> <p>※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。</p>	<p>適應症</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。</p> <p>※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N000065	E001380
品名	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。</p> <p>豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。</p> <p>雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。</p> <p>※停藥期：雞：5天，豬：15天。</p>	<p>適應症</p> <p>雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。</p> <p>豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。</p> <p>雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。</p> <p>※停藥期：雞：5天，豬：15天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	P610569	P611285
品名	賜福素散® Cephalin® Powder 20kg/Bag	賜福素散® Cephalin® Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains : Cephalexin Monohydrate....150 mg (potency)	Each gm contains : Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)
說明	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※本劑不可連續使用7天以上，停藥期：2天。</p>	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※本劑不可連續使用7天以上，停藥期：2天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N001097	E001665
品名	可立使淨-120 [®] Colistin-120 [®] Powder 500gm/Bag	林可黴素 40% [®] Lincomycin 40% [®] W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each gm contains : Colistin sulfate.....120 mg(potency)	Each kg contains : Lincomycin HCL....400gm(potency)
說明	<p>適應症 豬、小牛(3個月齡以下)、家禽(肉雞、火雞及產蛋雞)：治療對Colistin敏感之大腸桿菌或沙門氏菌所引起之消化道感染。(如有敗血症發生則需有相對應的附加治療)</p> <p>用法用量 將本劑溶於飲水中，立即給予，連續治療5~7天。 豬：每日每公斤體重給予本劑42~50mg。 小牛：每日每公斤體重給予本劑42~50mg。 家禽(肉雞、火雞及產蛋雞)：每日每公斤體重給予本劑50mg。 ※ 停藥期：3天。</p>	<p>適應症 豬：治療赤痢 雞：治療壞死性腸炎</p> <p>用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當於250 mg的Lincomycin，連續最多授予10天。 雞：每公升飲水添加相當於16.9 mg的Lincomycin，連續使用7天。 ※ 停藥期：豬：1天，雞：2天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	N000405	N000883
品名	可賜興-666 [®] Cotusin-666 [®] W.S.Powder	多欣-200 [®] Doxin-200 [®] W.S.Powder
成份	Each 150g contains : Lincomycin HCL....33.3gm Spectinomycin HCL....66.7gm	Each gm contains : Doxycycline Hyclate....200mg (potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 <p>用法用量</p> 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本劑不可與紅黴素同時使用。 2. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：8天。	<p>適應症</p> 治療家禽CRD及併發症如：可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎及大腸桿菌感染症。 <p>用法用量</p> 添加於飲水中，劑量為50ppm，即1噸水中添加本劑250公克。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：3天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

產品		
製品編號	E000633	E001706/E001490
品名	雅黴素飲水劑 [®] Erymycin WSP 500 [®] W.S.Powder 1kg/Tin	獲利欣10% [®] Floricin 10% [®] Solution 500mL/1000mL
成份	Each gm contains : Erythromycin Thiocyanate....500mg(potency)	Each mL contains : Florfenicol....100mg
說明	<p>適應症 雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療慢性呼吸器病(CRD)、傳染性鼻炎。</p> <p>用法用量 1.一般治療：每公噸飲水添加本劑200公克使用5天或依獸醫指示使用。 2.緊迫治療：每公噸飲水添加本劑200公克，最好在緊迫前二天即開始使用，繼續服用三天，在緊迫期間維生素及礦物質亦須添加。 ※注意事項： 1.本劑應禁止連續使用7天。 2.雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 3.停藥期：5天。</p>	<p>適應症 治療豬放線桿菌胸膜肺炎及雞大腸桿菌症。</p> <p>用法用量 豬:每日每公斤體重投與本品0.01mL~0.02mL相當於Florfenicol 1~2 mg(即本品0.01mL~0.02mL)之量，加入飲水混合後經口投與。雞每日飲水的1/4至1/2中，以每公斤體重投與本品0.2mL(相當於Florfenicol 20mg)，加入飲水混合後經口投與，連續使用五天。 ※停藥期：豬：3天，雞：5天，土番鴨：14天，雞16週齡以上，產蛋中之蛋雞不得使用。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E001586</p>	<p>E140487</p>
<p>品 名</p>	<p>泰康欣 250[®] Tiacosin 250[®] Solution 480mL/Btl</p>	<p>富鯤口服液20%[®] Furich Sol. 20%[®] Solution 1L/Btl</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Tilmicosin phosphate eq. to Tilmicosin....250mg(potency)</p>	<p>Each mL contains : Flumequine....200mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：對因Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes 以及其它對tilmicosin具感受性的微生物病源體所引起的豬呼吸道疾病之防治。 雞：對因Mycoplasma gallisepticum以及M. synoviae 所引起的雞呼吸道疾病之防治。</p> <p>用法用量 豬：100公升的飲水中加入81毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有200毫克的tilmicosin，且連續使用5天。 雞：100公升的飲水中加入30毫升的泰康欣濃縮液，等於每公升飲水含有75毫克的tilmicosin，且連續使用3天。 ※停藥期：12天</p>	<p>適應症 治療家禽之大腸桿菌症、沙門氏桿菌症、巴斯德桿菌症、傳染性可利查及葡萄球菌症等所引起之腸胃道和呼吸道感染症。</p> <p>用法用量 1. 家禽：每200公升飲水中添加100mL，溶解均勻即可。 2. 每日每公斤體重服用12mg Flumequine ※ 停藥期：7天</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

家禽用藥品

Poultry Drugs

水溶性散劑/液劑

Water soluble powder/Aqueous solution



產品		
製品編號	N000216	N000780
品名	經四環素-500 [®] Oxytetracycline-500 [®] W.S.Powder 1kg/Bag	泰樂新水溶性散 [®] Tylosin WSP [®] W.S.Powder 750g/Bag
成份	Each gm contains : Oxytetracycline HCL....500mg(potency)	Each gm contains : Tylosin Tartrate....0.667gm(potency)
說明	<p>適應症 治療豬具感性細菌感染所引起的腸炎及肺炎；治療雞具感性細菌感染所引起的慢性呼吸器病、傳染性可利查及下痢。</p> <p>用法用量 豬：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※ 停藥期：3天。</p>	<p>適應症 治療因Mycoplasma synoviae菌所引起之雞隻氣囊炎，及因Mycoplasma gallsepticum S6菌所引起之雞或火雞之慢性呼吸器病。</p> <p>用法用量 將150gm之泰樂新水溶性散劑溶入200公升水中，作為家禽唯一飲水來源，連續飲用2~5天。 ※ 停藥期：肉雞3天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑

Medicated feed additives

產品		
製品編號	N000498	P611199
品名	中化泰妙素 20% [®] C.C.P.C. Tiamulin 20% [®] Powder 1kg/Bag	中化泰妙素 20% [®] C.C.P.C. Tiamulin 20% [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains : Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency)	Each kg contains : Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 <p>用法用量</p> 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。	<p>適應症</p> 豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。 <p>用法用量</p> 豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。
處方藥別	第三類	第三類

家禽用藥品

Poultry Drugs

含藥物飼料添加劑

Medicated feed additives



產品	
製品編號	E003007
品名	泰黴素-220 [®] Tylosin-220 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains : Tylosin phosphate....220gm(potency)
說明	<p>適應症</p> <p>雞：促進生長及改進飼料利用效率 產蛋雞：改進飼料利用效率 豬：1. 可預防豬赤痢2. 促進生長及改進飼料利用效率</p> <p>用法用量</p> <p>雞：每噸飼料添加20~250公克 產蛋雞：每噸飼料添加100~250公克 豬：1. 預防豬赤痢：每噸飼料添加454~500公克連續餵飼3週後，改用200公克至出售。2. 促進生長及改進飼料利用效率：(1) 體重60kg以上的豬：每噸飼料添加50~100公克，(2) 體重30~60kg的豬：每噸飼料添加100~200公克，(3) 體重10~30kg的豬：每噸飼料添加100~500公克。</p>
處方藥別	

家禽用藥品

Poultry Drugs

其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N000113	N000319
品名	克嗽靈® Cousorin® Powder 1kg/Bag	克嗽靈® Cousorin® Powder 20kg/Bag
成份	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	<p>適應症</p> 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力，促進黏液的排出等。 <p>用法用量</p> 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。	<p>適應症</p> 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力，促進黏液的排出等。 <p>用法用量</p> 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。
處方藥別	第一類	第一類



中國化學製藥（股）公司

CCPC <http://www.ccpc.com.tw>



中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031